

Terrier İrkı Bir Köpekte Mukometra ile Birlikte Seyreden Kornu Uteri Hipoplazisi

Ahmet SABUNCU^{1}, Tuğba Seval Fatma TOYDEMİR¹, Sinem Özlem ENGİNLER¹,
Melih UÇMAK¹, Merih Duygu TÖRE¹*

¹*İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı, 34320, Avcılar, İstanbul*

***Sorumlu Yazar:** Ahmet Sabuncu İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fakültesi, Doğum ve Jinekoloji
Anabilim Dalı, 34320, Avcılar Kampus, Avcılar, İstanbul
e-posta:ahmetsabuncu1968@yahoo.com, Tel: +90 212 473 7070-17316

Geliş Tarihi /Received: 17.01.2011

ÖZET

Yedi yaşında Terrier ırkı, kısırlaştırılmamış bir köpek uzun süren iştahsızlık, abdomen bölgesinde büyümeye, konstipasyon ve anüri şikayetleri ile kliniğimize getirildi. Yapılan abdominosentezde idrar kesesi olduğu düşünülen şişkinlikten oldukça koyu kıvamlı bir akıntı geldiği ve abdominal ultrasonografide idrar kesesinin ventro-kranialinde kornu uterinin oldukça dilate ve hipoekoik olarak göründüğü tespit edildi. İlk olarak pyometra olduğu düşünülen hasta acil olarak ovariohisterektomi operasyonuna alındı. Operasyon esnasında tek kornu uterinin gelişmemiş olduğu, diğer kornu uterinin ve korpusun ise dilate ve idrar kesesine yapışmış olduğu tespit edildi. Mikrobiyolojik olarak uterus takı akıntının aseptik olması sonucunda hastaya mukometra ile seyreden kornu hipoplazisi teşhisi konuldu.

Anahtar Kelimeler: Dişi köpek, hipoplazik uterus, mukometra

ABSTRACT

HYPOPLASIA OF CORNU UTERI IN A TERRIER BITCH WITH MUCOMETRA

A seven-years-old, intact Terrier bitch was admitted to our clinic with the history of loss of appetite, enlargement of abdomen, constipation and anuria. Distended part of the abdomen thought to be the bladder and abdominocentesis was performed. A kind of thick, viscous fluid was taken by this procedure. Abdominal ultrasonography revealed enlargement of the uterine horns filled with a hypoechoic fluid ventro-cranially located from the bladder. It was firstly diagnosed as pyometra and ovariohysterectomy performed. At ovariohysterectomy, it was found only one dilated uterine horn stuck to the vesica urinaria and hypoplasia of the ipsilateral cornu uteri. The uterine fluid was found to be aseptic microbiologically and it was diagnosed as hypoplasia of the cornu uteri and mucometra.

Key Words: Bitch, hypoplasia of uterus, mucometra

Giriş

Köpek ve kedi uterus anomalileri doğmasal olarak görülen nadir anomalilerdir (Coelho ve ark., 2009; Slatter, 2002). Uterus

kornularının kısmi birleşmesi veya eşit olmayan uterus kornu uzunlukları dişi köpeklerde görülebilen anomalik durumlardan sayılabilir

(Lein, 1986). Genital kanalın kısmi aplazisi terim olarak genital kanalın uterus, serviks ve/veya vagina kısımlarının olmaması anlamına gelir. Üreme sisteminin anomalileri inekte ve domuzda daha sıklıkla görülmürken, kedilerde daha az görülmektedir. Uterusun doğmasal anomalilerin çoğunluğu uterus kornularını kapsar. Doğmasal gelişim anomalileri olan bilateral agenezis, uterus unikornisini de kapsayan unilateral agenezis veya hemi uterus, kısmi aplazi, hipoplazi, atrezi, septumlu uterus, çift serviks ve kornual birleşme gibi çoğunlukla Müller kanalının anormal gelişimine (agenezi, hipoplazi) bağlıdır (Chang ve ark., 2008; Slatter, 2002). Oviduktlar, uterus, kornular ve vagina embriyonik olarak Müller kanallarından farklılaşır (Chang ve ark., 2008). Uterus kornusunun bir kısmının olmaması, paramezonfrik kanalın bir kısmının gelişimindeki hasarların sonucunda oluşur, bu durumda, uterus kornuları olmayabilir veya sadece küçük bir fibromusküler bant olabilir. Bir uterus kornusunun olmaması aynı taraftaki böbreğin de olmaması ile beraber görülebilir.

Aplazi kornu uteri ve oviduktun birini kapsıyorsa fertilitet etkilenmeyebilir veya bazen zayıflayabilir (Coelho ve ark., 2009; Dinç, 1997). Ovaryumlari bulunan uterus unikornisli dişi köpeklerin tipik östrus davranışları gösterdikleri, seksüel siklusların ve ovulasyonun olduğu, çiftleşmelerin olduğu bilinmektedir (Dinç, 1997; England, 2001; Feldman ve Nelson, 2004; Güvenç ve ark., 2006). İki taraflı kornu agenezisi olan köpeklerde oositin geçiş ve taşınması ile implantasyon şekillenmeyeceğinden gebe kalma imkansızdır. Buna rağmen tek taraflı kornu agenesizinde gebelik şansı zayıftır, gebelik olussa bile yavru sayısı azdır (Dinç, 1997; England, 2001; Güvenç ve ark., 2006). Hidrometra veya mukometra endometriyal hiperplazi gelişiminden dolayı veya uterus, serviks veya vagina lumeninin tikanması sonucunda oluşabilir (Oh ve ark., 2005). Oh ve ark. (2005), bu iki olgunun (hidrometra ve mukometra) aynı olduğunu, fiziksel özellik olarak sadece müsinin hidratlaşma derecesindeki farklılaşmaya bağlı olarak oluşturuklarını düşünmektedirler. Bu tip olgularda

tek kornu ve olasılıkla aynı tarafa ait ovarium olmayabilir veya uterusun kör kısımları görülebilir ve bu kısımlarda her bir östrus siklusunda sıvı birikimi olabilir (Lein 1986).


Slatter (2002), uterus unikornis insidensisinin köpek nekropsilerinde 1:5000'den 1:10000'e kadar olduğunu bildirmiştir. Ovaryumlara ve uterusa bağlı doğmasal rahatsızlıkların teşhisi direkt olarak histerosalpingografi ile yapılabilir fakat deneyel laparotomi ile doğrulanması önerilmektedir (Coelho ve ark., 2009; Dinç, 1997; Güvenç ve ark., 2006). Bir başka teşhis yöntemi laparoskopidir fakat genellikle rutin kısırlaştırma ameliyatı esnasında şans eseri de fark edilebilirler. Bazıları infertiliteye veya güç doğum sebep olabilir (Coelho ve ark., 2009; Güvenç ve ark., 2006). Histerosalpingografi, iyi bir teorik araç olmasının yanında pratikte kullanımı oldukça zordur, çoğunlukla östrus esnasında uygulanmasından başarılı sonuçlar alınabilir (Feldman ve Nelson, 2004).

Olgu

Yedi yaşında, kısırlaştırılmamış, Terrier ırkı köpek depresyon, iştahsızlık, abdomende büyümeye, konstipasyon ve anüri şikayetiley kliniğimize getirildi. Vücut ısısı $38,7^{\circ}\text{C}$ olarak tespit edilen köpekte kan tahlili sonuçlarına göre hafif azotemi ve glisemi tespit edildi (Üre: 30, glikoz: 154). İnceleme ve palpasyonda abdomenin oldukça genişlemiş olduğu, vulvanın normal görünümde olduğu ve herhangi bir akıntı olmadığı belirlendi. Hasta sondalanmaya çalışıldı, sondalamadan sonuç alınamayınca abdominosentez yapıldı fakat bu kez idrar yerine vizközitesi oldukça yüksek, kahverengimsiz bir sıvının geldiği görüldü. Abdominal ultrasonografi yapılan köpekte idrar kesesinin ventro-kraniyalinde oldukça genişlemiş hipoekoik görüntü veren kornu uteri tespit edildi. Acil olarak ovariohisterektomi operayonu uygulanmasına karar verildi. Hastanın damar yolu V. cephalica antebrachii'den açılarak anestezinin indüksiyonu amacıyla 6 mg/kg dozunda propofol (Pofol ampul, Dongkook Pharm, Kore) verildi, daha sonra ise anestezinin


devamına % 3-4 oranında isofloran (Foran likit, Abbott Labaratories, İngiltere) ile inhalasyon anestezisi uygulanarak devam edildi. Operasyon sahası traş ve dezenfekte edildikten sonra göbek deliginin bir iki parmak kaudalinden ensize edilerek abdominal boşluğa girildi. Operasyon esnasında sol kornu uterinin hipoplazik olduğu, diğer kornu uterinin ise oldukça genişlemiş ve korpus uteri kısmından idrar kesesine yapışmış olduğu görüldü (Şekil 1). Korpus uteri bir enjektörle aspire edildi ve koyu kahverengi vizköz bir akıntıının geldiği görüldü (Şekil 2A, B). Sol kornunun sağ kornu uteriye göre oldukça küçük ve gelişmemiş olduğu, sağ kornu uterinin ise içindeki sıvuya

bağlı olarak normalden daha geniş olduğu belirlendi (Şekil 3A). Hipoplazik sol kornunun ucunda üzerinde folliküllerin bulunduğu ovaryum saptandi (Şekil 3B). Ovaryular ve uterus uzaklaştırıldıktan sonra laparotomi ensizyonu 2/0 monofilament ile basit ayrı dikişler kullanılarak kapatıldı. Operasyon sonrasında hastaya 5 mg/kg dozunda enrofloksasin (Baytril-K % 5, Bayer, Türkiye) subkutan olarak ve B kompleks-C vitamini kombinasyonu (Epargriseovit; Deva, Türkiye) intramusküler olarak bir hafta boyunca uygulandı, on gün sonra ise komplikasyonsuz olarak hastanın dikişleri alındı.




Şekil 1. Laparotomi esnasında sağ kornu ve korpus uterinin görünümü (siyah ok: korpus uteri, beyaz ok: idrar kesesi).

Figure 1. The view of the corpus and right cornu uteri during laparotomy (black arrow: corpus uteri, white arrow: urinary bladder).



Şekil 2. Korpus uteriden koyu kahverengi vizköz sıvının enjektörle aspirasyonu (A), Korpus uterinin ensizyonu (B).

Figure 2. Aspiration of viscous dark brown fluid from the corpus uteri with a syringe (A), Incision of corpus uteri (B).



Şekil 3. (A) Korpus uterinin ligatüre edilmesi (beyaz ok: idrar kesesi), (B) hipoplazik sol kornu uteri (siyah ok), sol ovaryum (beyaz ok).

Figure 3. (A) Ligation of corpus uteri (white arrow: urinary bladder), (B) hypoplasia of left cornu uteri (black arrow), left ovary (white arrow).

Operasyondan yaklaşık olarak bir ay sonra köpek yine abdomende hafif şişkinlik, iştahsızlık ve dizüri şikayetleriyle kliniğimize getirildi. Yapılan ultrasonografi sonucunda serviks uterinin genişlemiş olduğu görüldü ve köpek tekrar opere edilerek serviksin kalan parçası uzaklaştırıldı. İkinci operasyon sonrasında hiçbir komplikasyonla karşılaşılmadı.

Tartışma ve Sonuç

Hipoplazik uterusa sahip olan köpekler düzenli olarak östrus gösterebilirler ve gebe kalabilirler. Deneysel olarak da bir kornu uterinin uzaklaştırılması sonucunda gebelik olusabilmekte fakat yavru sayısı azalmaktadır (Seyrek İntaş ve ark., 2004). Doğmasal genital organ anomalilerinin bazen infertiliteye de neden olduğu görülmüştür. Bu olguda köpekte düzenli olarak siklik aktivitenin olduğu fakat

daha önce hiç gebelik geçirmediği bilgisi hasta sahibi tarafından belirtilmiştir.

Müller kanallarının kısmi aplazisi korpus ve kornu uterilerin kısmi veya tamamen aplazisine sebep olmaktadır. Genellikle kısmi uterus aplazisi ve uterus unikornis olguları aynı taraftaki ovaryumun ve/veya böbreğin agenezisiyle beraber seyredebilir (Chang ve ark., 2008; Slatter, 2002). Bu olguda ise hipoplaziye bağlı olarak taraftaki ovaryum veya böbrekte aplazi görülmeli.

Endometriyal hiperplazi veya genital kanalın herhangi bir yerinde tikanıklık bulunması sonucunda mukometra veya hidrometra şekillenebilmektedir (Oh ve ark., 2005). Bu olguda da korpus uteri ve sağ kornuda mukometra görüldü. Köpeğin yaşıının genç olması ve endometriyal hiperplaziye sebep olabilecek daha önceden herhangi bir hormon preparati kullanılmamış olması bu olguda

mukometra oluşumuna sebep olacak bir genital kanal tıkanıklığını akla getirmiştir. Kornual agenezis veya hipoplazi olguları genellikle belirti göstermemekte, ovariohisterektomi operasyonları esnasında rastlanılmakta ve bu yüzden gizli infertilite sebepleri arasında sayılmaktadır (Coelho ve ark., 2009; Slatter, 2002). Bu olguda ise şiddetli abdomen genişlemesi ve anüri gibi hastanın hayatını tehlkiye sokabilecek belirtiler görülmeli ve hastanın acil olarak operasyona alınmasıyla, ultrasonografide saptanamayan hipoplazi, laparotomi esnasında fark edilmiştir.

KAYNAKLAR

- Chang, J., Jung, J-h., Yoon, J., Choi, M-c., Park, J.H., Seo, K-M., Jeong, S.M., 2008.** Segmental aplasia of the uterine horn with ipsilateral renal agenesis in a cat. Journal of Veterinary Medical Science 70 (6), 641-643.
- Coelho, A.J.A., Contesini, E.A., Marques, J.M.V., Fernandes, A.O., Cardoso, C.S., Garcez, T.N.A., Rolim, V.M., 2009.** Segmental aplasia of uterine horn in a dog:case report. WSAVA Congress Sao Paulo, Brazil: <http://www.vin.com/proceedings/Proceedings.php?CID=WSAVA2009&Category=&PID=53733&O=Generic> (Erişim 08.02.2011).
- Dinç, D.A., 1997.** Karnivorlarda İnfertilite. In: Alaçam E. (Ed), Evcil Hayvanlarda Doğum ve İnfertilite. Ankara, Medisan, pp. 315-340.
- England, G., 2001.** Infertility in the Bitch and Queen. In: Noakes, D.E., Parkinson, T.J., England, G.C.W. (Eds.), Arthur's Veterinary Reproduction and Obstetrics. Toronto, W.B. Saunders Company, pp. 639-670.
- Feldman, E.C., Nelson, R.W., 2004.** Infertility, Associated Breeding Disorders, and Disorders of Sexual Development. In: Feldman E.C., Nelson R.W. (Eds.), Canine and Feline Endocrinology and Reproduction. Philadelphia, W.B. Saunders, pp. 868-900.
- Güvenç, K., Toydemir, F.S., Sontas, H.B., Şenünver, A., 2006.** A Cocker Spaniel bitch with uterus unicornis (unilateral cornual agenesis). İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 32 (3), 69-73.
- Lein, D.H., 1986.** Infertility and Reproductive Diseases in Bitches and Queens. In: Roberts S. J. (Ed.), Veterinary Obstetrics and Genital Diseases (Theriogenology). Vermont, Ithaca, New York, pp. 675-751.
- Oh, K-S., Son, C-H., Kim, B-S., Hwang, S-S., Kim, Y-J., Park, S-J., Jeong, J-H., Jeong C., Park, S-H., Cho, K-O., 2005.** Segmental aplasia of uterine body in an adult mixed breed dog. Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 17, 490-492.
- Seyrek-İntas, K., Wehrend, A., Nak, Y., Tek, H.B., Yilmazbaş, G., Gökhan, T., Bostedt, H., 2004.** Unilateral hysterectomy (cornuectomy) in the bitch and its effect on subsequent fertility. Theriogenology 61, 1713-1717.
- Slatter, D.H., 2002.** Ovary and Uterus. In: Slatter, D.H., (Ed); Textbook of Small Animal Surgery. W.B. Saunders Company, Philadelphia., pp. 1487-1502.