

## **AKDENİZ BÖLGESİNDEN YETİŞME ORTAMI BÖLGESEL SINIFLANDIRMASININ YORUMU**

**Doç. Dr. M. Doğan KANTARCI<sup>1</sup>**

### **Kısa Özeti**

Türkiye'nin % 15'ini kapsayan Akdeniz Bölgesi yeryüzü şekli-iklim özelliklerine ve bunlara bağlı olarak doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışına göre dört yetişme ortamı bölgeleri grubuna, 11 yetişme ortamı bölgесine ve 70 yetişme ortamı yöresine ayırdılmıştır. Bölge arazisinin % 19,2'si tarıma uygundur. Ayrıca arazinin % 4,8'i kontrollü tarıma uygundur. Arazinin % 66,1'i ise ormancılığa ve hayvancılığa uygundur. Geniş alanlardaki tahrıbatın sonucunda bugünkü orman alanı bölgemin % 49,1'ini kapsamaktadır. Toplam 4,4 milyon ha olan bu orman alanının ancak % 7'si normal kapalı ve üretim yapabilir durumdadır. Akdeniz Bölgesinin tarım, ormancılık ve hayvancılık alanındaki yüksek potansiyell ile Akdeniz'de ve Orta Doğu'daki konumu Türkiye'nin dış ticareti bakımından stratejik bir değer taşımaktadır. Bu nedenle Akdeniz Ormancılığına olduğu kadar bölgedeki tarım, hayvancılık, turizm, sağlık ve spor ile ilgili planlamalara ve yatırımlara temel olabilecek ekolojik bilgilerin sağlanması için yetişme ortamı bölgесel birimleri ayırdılmıştır.

### **GİRİŞ**

Akdeniz Bölgesi Türkiye'nin % 15'ini kaplayan ve ülkenin dış ticareti ile ekonomik gelişimi üzerinde önemli etkilere sahip stratejik değerde bir coğrafya bölgemizdir. Akdeniz Bölgesinde tarım, ormancılık, hayvancılık, turizm, dinlenme-spor ve sağlık alanlarında yapılacak yatırımların giderek geleceği ve bu yatırımların Türkiye için çok olumlu sonuçlar vereceği anlaşılmaktadır. Bu nedenle bölgemin ekolojik özelliklerinden bir kısmı canlıların yetişme-yaşama ortamı özellikleri olarak ele alınıp incelenmiş ve yetişme ortamı bölgeleri, yörenleri ile yükseltti - iklim kuşakları ayırdılmıştır (Kantarci, M.D. 1984). Ayırdıilen bölgесel ve yöresel yetişme ortamı birimlerinin özellikleri açık hava şartlarının etkisi altında çalışmak durumunda olan işletmelerin planlanması, yönetiminde ve yeni yatırımlarında göz önünde bulundurulması gereken temel esaslar arasındadır. Söz konusu sınıflandırma bilimsel bakımdan olduğu kadar, eğitim ve öğretimde kullanılabilecek birçok sonucun da elde edilmesini sağlamıştır.

<sup>1</sup> 1.Ü. Orman Fakültesi Toprak İlimi ve Ekoloji Abd. Bahçeköy - İSTANBUL

Yayın Komisyonuna Sunulduğu Tarih : 15.2.1985

## 2. AKDENİZ BÖLGESİNDEN YETİŞME ORTAMI BÖLGESEL SINIFLANDIRMASI

Akdeniz Bölgesinde 4 tane yetişme ortamı bölgeleri grubu, 11 tane yetişme ortamı bölgeleri ve 70 tane de yetişme ortamı yörensi ayırdedilmişdir. Deniz Etkisi Altındaki Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubunda ayırdedilen iki yetişme ortamı bölgelerinin herbirinde kıçılçam, sedir ve orman üstü kuşağı olmak üzere üç ana yükselti iklim kuşağı ayırdedilmiştir. Yükselti-iklim kuşakları alt kuşaklara, alt kuşaklar da yörelere ve alt yörelere ayrılmıştır. Akdeniz İç Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubunda ayırdedilen iki yetişme ortamı bölgeleri ile Göller Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubunda ayırdedilen dört yetişme ortamı bölgeleri ve Akdeniz Ardi Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubunda ayırdedilen üç yetişme ortamı bölgeleri yetişme ortamı yörenlerine, yörenler de alt yörelere ayırdedilmiştir. Bu bölgelerdeki yükselti-iklim kuşakları bazı yerlerde yörenler, bazan da alt yörenler halinde ayrılmışlardır. Tablo 1'de ayırdedilen yetişme ortamı birimleri ile bunların yıllık, dört yaz ayı ve ocak ayına ait iklim değerleri verilmiştir.

## 3. ELDE EDİLEN BİLGİLERİN KISA YORUMU

**3.1. Ekoloji açısından,** öncelikle ekolojinin bir dalı olan Yetişme Ortamı Bilgisi açısından elde edilen sonuçlar ilgi çekicidir. Akdeniz ile İç Anadolu yaylası arasında ve kisa bir yatay mesafede 2000 - 3000 m yükseltilerle dik bir duvar oluşturan Toros Dağları ılık ve nemli akdeniz iklimi ile soğuk ve kurak kara iklimini birbirinden kesin sınırlarla ayırmaktadır. Toros Dağlarının eksenlerinin uzanış yönleri Akdeniz üzerinden gelen nemli ve ılık güneybatı rüzgârlarının etkisinin farklı ölçülerde alınmasına sebeb olmaktadır. Aynı durum Toros Dağlarının güney yamaçlarındaki vadilerin açılış yönlerine bağlı olarak da farklı yetişme ortamı özelliklerinin ortaya çıkmasına sebeb olmaktadır. Böylece, Batı Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesinde yağışların daha fazla olduğu, Doğu Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesinde ve özellikle güneydoğu bakılı yamaçlar (Bolkar Dağları) ile güneybatı rüzgârını alamayan yamaçlarda yağışın daha az, iklimin de daha kuru oluşunun sebebi açıklanabilmektedir (Tablo 1 ve kesit 1, 2, 3). Benzer yağış farklıları güney ve güneybatıya açılan Dalaman, Koca Çay, Alakır, Aksu, Köprü Çayı, Manavgat Irmağı, Dim Çayı ve Seyhan ile Ceyhan vadileri ile güneydoğuya açılan Göksu Vadisi ve Seyhan ile Ceyhan vadilerinin yukarı kolları arasında da belirgin olarak görülmektedir (Tablo 1).

Toros Dağlarının arasında kalan yukarı havzalar ile kapalı havzalar deniz etkisini kısmen almakta veya alamamaktadır. Bu iç havzalarda karasal iklim özellikleri hakimdir (Tablo 1 ve kesit 4).

Gölle yetişme ortamı bölgelerinde de iklimin karasal karakteri ağır basmaktadır. Ancak bu bölgelerde hakim olan kuzeydoğu rüzgârları, göllerin batısındaki yamaçlar üzerinde nemli etkiler yapmalarını sağlamaktadır (Tablo 1 ve kesit 5).

Akdeniz Ardi Yetişme Ortamı Bölgeleri ise İç Anadolu'nun karasal ikliminin etkisi altındadır. Buralarda yetişme ortamı özellikleri Akdenize bakan yamaçlardan tamamen farklıdır (Tablo 1 ve kesit 2). Ormanların tahribi ve aşırı otlatmaların da etkisi sonucunda bozulan ekolojik denge buradaki kurak yetişme ortamı şartlarında doğal olarak yeniden sağlanamamaktadır. Bu nedenle Akdeniz Ardi Yetişme ortamı bölgelerinin çiplak görünümü karakteristikdir.

Yetişme ortamı bölgeleri sınıflandırması daha önce Trakya'da tarafımızdan yapılmış olan sınıflandırmalarda kullanılan yöntemin Akdeniz Bölgesinde aynen uygulanamayacağını göstermiştir. Esasen Trakya'da uygulanan yöntemin Kuzey ve Güney Trakya arasında da farklı olarak kullanıldığı daha önce de belirtilmiştir (Kantarci, M.D. 1976-1979, Irmak, A., A. Kurter, M.D. Kantarci 1980). Kullanılan yöntem G.A. Krauss ile G. Schlenker tarafından kombine yetişme ortamı sınıflandırması olarak ortaya atılmış ve Güney Almanya'da uygulanmıştır (Kantarci, M.D. 1980). Kombine yöntem dünyanın veya bir ülkenin her yerinde geçerli olan bir sınıflandırma şablonu değildir. Bu yöntem bir şablondan ziyade bir değerlendirmeye-sınıflandırma prensibidir. Yöntemin bir sınıflandırma prensibi olarak Akdeniz Bölgesinde de başarı ile uygulanabilecegi ortaya konulmuştur (Kantarci, M.D. 1982-1 ve 1984). Bu sonuç ülkemizde uygulanacak yetişme ortamı sınıflandırmalarında olduğu kadar ekoloji eğitimi ve öğretimi bakımından da çok önemlidir.

**3.2. Toprak İlimi açısından** elde edilen sonuçları sayısal değerle ifade etmek şimdilik mümkün değildir. Yapılan yetişme ortamı sınıflandırmalarında toprak özelliklerinin laboratuvara araştırılması ile elde edilecek bilgilerin kullanılabilmesi ayrıntılara inilmemiştir. Ancak arazideki incelemelerimiz bazı ilginç sonuçlara varmamızı sağlamıştır. Akdeniz Bölgesi'nde kireç taşları, kireçli konglomeratlar, kireç çimentolu kum taşları, kireçli flişler, travertenler, kireçli tortul materyaller ve diğer kireçli anakayalar bölgenin hemen tamamına yakın kısmını kaplamaktadır. Bu kireçli anakaya ve anamateryallerden oluşan topraklar, farklı derinlik ve taşılık değerleri göstermektedirler. Ancak hepsinin ortak karakteri alkali reaksiyonlu ve kalsiyumca zengin oluşu vardır. Bu toprakların genetik gelişimleri üzerinde yeryüzü şekli-iklim özelliklerinin etkisi belirgin olarak gözlenmektedir. Doğal bitki örtüsünün aşırı derecede tahribi sonucunda erozyona uğramış olan topraklar, yukarıdaki değerlendirmenin dışındadırlar (Toprak Genetiği açısından), Kapalılığı bozulmamış ormanların altında yaptığımız incelemeler Kızılıçam Kuşağındaki toprak oluşumu ile Sedir Kuşağındaki toprak oluşumu ve gelişimi arasında bazı farkların söz konusu olduğunu göstermiştir. Sedir Üst Kuşağında ise kireç taşıdan oluşmuş topraklarda yıkama ve birikme horizonlarının gelişmiş olduğunu gördük. Denize bakan yamaçlardaki yükselti-iklim kuşaklarının toprak oluşum ve gelişimleri ile karasal iklim tiplerinin hakim olduğu yörelerdeki toprak oluşum ve gelişimi arasındaki farklar iklimin özelliklerinin etkisi bakımından yeterli bilgiyi vermemektedir. Akdeniz Bölgesi'nde varılan bu sonuç iklimin toprak oluşumu ve gelişimi üzerindeki mutlak hakimiyetini göstermektedir. Ancak iklimin bu kadar belirgin olarak etkili olduğu Akdeniz Bölgesi'nde bile anakaya özelliklerinin de toprak oluşum ve gelişiminde önemli etkileri olduğunu belirtmek gereklidir. Kireç taşları ile konglomeratlar, kum taşları, travertenler ve flişler arasında olduğu kadar bunlarla tortul materyaller ve mağmatik kökenli anakayalar arasında toprak özellikleri bakımından dikkate değer farklar vardır. Bütün bu farklı etkilere rağmen, anakaya özelliklerini bölgeler ve yöresel sınıflandırmalarda kullanmak mümkün olmamıştır. Çünkü toprakların hemen tamamında alkali reaksiyon ve yüksek kalsiyum içeriği, toprakların diğer özelliklerinin bitkilerin yayılışında etkili olabilmesini önlemiştir. Yeryüzü şekli ve iklim özellikleri ise, toprak özelliklerinden daha belirgin olarak bitkilerin yayılışını etkilemiştir. Bu yönde devam ettirilecek olan tartışmalar herhalde toprak genetiği açısından çok ilginç sonuçlara ulaşmamızı sağlayacaktır.

**3.3. Akdeniz Bölgesinde arazinin** % 19.2'sinin tarıma uygun olan I + II + III. yetenek sınıfları grubunda, % 4.8'inin toprak koruma tedbirleri alınmak ön şartı ile tarım yapılabilecek nitelikte olan IV. yetenek sınıfında, % 66.1'inin ise, ormancılığa ve mer'aya

uygun olan V+VI+VII. yetenek sınıfları grubunda bulunduğu görülmektedir. Orman alanları aşırı tariplerin sonucunda bölgenin ancak % 49.1'ini kaplayabilir durumdadır. Tarım arazisinin poansiyel alanının darlığı dikkati çekmektedir. Tarım alanı olarak kullanılan arazi ise potansiyel sınırların dışına taşmış olup bölgenin % 29.2'sini kapsamaktadır. Arazinin sarılığı ve otlağ olarak kullanılacak alanların özellikle 2000 m'nin üstünde daha geniş olarak bulunması ormanların otlağa dönüştürülmesine sebep olmuştur. Öte yandan yerleşme ve sanayi alanlarının I + II + III. sınıf arazide yoğunlaşması olumsuz bir gelişmedir. Doğu Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesinde yerleşme alanlarının % 44.1'i, K. Maraş ilinde ise % 46.8'i bu tür arazide bulunmaktadır. Tarım alanları plânsız bir yerleşme ve sanayileşme ile beton yiğinlarına dönüştürülerken daha da daraltılmaktadır.

**3.4. Akdeniz Bölgesinde orman alanları** 4.4 milyon ha'ı kaplamaktadır. Toplam 39 orman işletmesince işletilmeğe çalışılan ormanların ancak % 7'sinde iyi nitelikli ve kaptılığı % 70'in üzerinde olan ormanlar bulunmaktadır. Geri kalan orman alanlarının % 62'si çok bozuk, % 15'i bozuk nitelikli olmak üzere % 77'si tahrib edilmiş ve üretim dışı kalmıştır. Ormanların % 16'sında ise kapalılık, % 40-70 arasına düşmüş, seyrelmiş ve üretim gücü zayıflamıştır. Akdeniz Bölgesinde toplam 3.4 milyon ha orman alanı yeniden ağaçlandırılarak üretim yapabilecek duruma getirilmelidir.

Bölgelerde hızlı büyuyen türlerden olan Kızıl Çam ile değerli ve dayanıklı odunu olan Sedir geniş alanlarda orman kurun ve ekonomik değeri yüksek olan orman ağaçlarımızdır. Ağaçlandırılması gereken fakat ilk bakişa kayalık gibi görünen arazide bile uygun dikim ve ekim yöntemleri ile bu türlerin başarılı bir şekilde yetiştirebilediği görülmektedir. Ancak yeni ormanların kurulmasında kullanılacak orjinlerin seçilmesi ve yetiştirebilme alanları herhalde ayırdedilmiş olan yetişme ortamı birimlerinin (yüksekti-iklim kuşakları ve yöreler) özelliklerini göz önünde tutularak kararlaştırılmalıdır<sup>2</sup>.

**3.5. Doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışı** Akdeniz Bölgesinde hakim olan iklim özelliklerinin etki alanlarının tahmin edilmesinde çok değerli bir gösterge olmuştur. Bu değerlendirmede yer yüzü şekli özellikleri ve hakim rüzgâr yönleri de göz önünde tutulmuştur. Doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışı sadece orman ve çalılıkların tür bileşimi olarak incelenmemiştir. Bu yöndeki incelemeler yetişme ortamı özellikleri ön planda tutularak yürütülmüştür.

Akdenize bakan yamaçlarda, Batı Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesinde Kızılıçam Kuşağı (0-1200 m), Sedir Kuşağı (1200 - 2000 m) ve Orman Üstü Kuşağı (> 2000 m) olmak üzere üç ana kuşak ayırdedilebilmektedir. Kızılıçam Kuşağında; Kıyı Kuşağı (< 100 m), Kızılıçam Alt Kuşağı (100-500 m), Kızılıçam Orta Kuşağı (500-1000 m) ve Kızılıçam Üst Kuşağı (1000 - 1200/1300 m) arasında olmak üzere ayrılmıştır. Sedir Kuşağı ise; Sedir Alt Kuşağı (1200 - 1500 m), Sedir Orta Kuşağı (1500 - 1750 m) ve Sedir Üst Kuşağı (1750 - 2000 m) olmak üzere üç alt kuşaga ayrılmıştır. Orman Üstü Kuşağı, biri Otlakları Kuşağı (2000 - 25000 m), diğeri Alp Kuşağı (> 2500 m) olmak üzere ikiye ayrılmıştır. (Kesit 1 ve 2).

2 Bucak-Seydiköy ağaçlandırmasında Antalya - Düzlerçamı orjinli, Kızılıçam fidanları kullanılmış ve bunların çoğu (özellikle kuzey ve kuzeydoğu baklı yamaçlardakiler) donmuşdur. Donma olayında yanlış orjinli Kızılıçam fidanlarının kullanılması yanında sık dikimin de etkisi olmuştur. Sık olarak gelişen meşerede soğuk hava durgunlaşmış ve fidanların çögünün donmasına sebep olmuştur. Meşere seyreltildikten sonra donma olayları azalmıştır.

Doğu Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesinde ise Batı Akdeniz Bölgesinde sınırları verilen kuşaklar aynen ayırdedilmişlerdir. Ancak deniz etkisini daha az alan Göksu Vadisi ile Bulkar Dağlarının güneydoğu baklı yamaçlarında ve benzer yörelerde Kızılıçam Kuşağıının üst kesimi ile Sedir Kuşağıının alt kesiminde karaçam-meşeler ve ardıcların hakim olduğu bir ara kuşak yer almaktadır (Kesit 3). Bu ara kuşagın bulunduğu, yamaçların bakişından dolayı güneybatıdan gelen ve deniz etkisini getiren hakim rüzgârların etkilerinin azalmasına bağlıdır. Deniz rüzgârlarını cepheden alan Toros-Amanos sisteminde ise yağış ve nemin yüksekliği nedeni ile Sedir Kuşağında Doğu Kayını (*Fagus orientalis*) da yer almaktadır.

Akdeniz çalı formasyonu (maki) gerek Batı, gerekse Doğu Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgesinde kıyıdan 2000 m'ye kadar ormanların tahripedildiği yerlerde sekunder bir bitki örtüsü olarak gelişmiştir. Ancak, Akdeniz çalı formasyonu her kuşakta ve her kuşağın farklı yörelerinde yetişme ortamı özelliklerine bağlı olarak farklı türlerle temsil edilmektedir (Kesit 1, 2, 3, 4, 5 ile tablo 1'i karşılaştırınız).

Akdeniz İç yetişme ortamı bölgelerinde ve özellikle Elmalı ile Korkuteli - Bozova'da deniz etkisinin pek az alınması veya alınmaması sonucunda geniş don çukurları oluşumu görülmektedir. Bu geniş don çukurlarında ardıç ormanları yer almaktadır. Şiddetli bir ölçüde tahripedilmiş olan bu ardıç ormanları veya ardıç kuşağı sedir kuşağının altında bulunmaktadır. Sedir kuşağının üst kesiminde ise ardıçlar yeniden ormanın tür bileşimine karışmaktadır (Kesit 4).

Göller yetişme ortamı bölgelerinde hakim olan kuzey doğu rüzgârlarının etkisi ile göllerin batısındaki yamaçlar daha nemli olduklarından, buralardaki ormanların tür bileşimi de doğudaki yamaçlardan daha zengindir (Kesit 5).

Akdeniz ardi yetişme ortamı bölgelerinde karasal karakterli dağ ikliminin hakimiyeti doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışını ve ormanın tür bileşimini de kuvvetle etkilemiştir. Bu bölgelerde ardıçlar ile meşelerin hakim olduğu görülmektedir. Karaçamın da orman kurduğu veya ormanın tür bileşime katıldığı, ancak şiddetli taripler sonucunda yayılış alanının daraldığı anlaşılmaktadır (Kesit 2).

Doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışı ve ormanların tür bileşiminin yetişme ortamının bölgесel özelliklerine göre gösterdiği farklar, Akdeniz Bölgesi Ormancılığının ekolojik esasları hakkında önemli bilgiler vermektedir. Kızılıçam ormanları ile sedir ormanlarında yükselti-iklim kuşaklarına göre beslenme-boylanma durumu üzerinde yürütmekte olduğumuz araştırmalarдан elde ettigimiz ön sonuçlar da ilerideki yayınlarımızda bu bilgilere eklenecektir.

**3.6. Kızılıçam ormanlarının yayılış alanındaki iklim değerleri** incelendiğinde Kızılıçamın yayılışında sıcaklık değerlerinin yağış değerlerinden daha önemli olduğu anlaşılmaktadır. Yayılış alanında Kızılıçamın yükselti-iklim kuşaklarına göre beslenme-boylanma durumu üzerine yaptığımız araştırmamın ön sonuçlarına göre yükselti ile artan yağışın Kızılıçamın büyümeye üzerinde olumlu etkisi ortaya çıkmıştır. Burada ise Kızılıçamın bütün yayılış alanındaki iklim özelliklerinden söz edilmektedir. Kızılıçamın Akdeniz Bölgesinde 1200 m'ye kadar olan yayılış alanında yıllık ortalama sıcaklığın 11.5°C'tan yüksek, dört yaz ayındaki ortalama sıcaklığın 20.5°C'tan yüksek, yılın en soğuk ayı olan ocak ayındaki ortalama sıcaklığın ise 1.5°C'tan yüksek (Kızılıçam üst kuşağında genellikle 3-5°C arasında) bulunduğu anlaşılmaktadır. Kızılıçamın yataş yayılış alanının en kuzey ucunda yıllık ortalama sıcaklık, Keşan'da 14.4°C, Göztepe'de 14°C, Karabük'te 13.9°C, Erbaa'da 14.6°C, dört yaz ayının-

daki ortalama sıcaklık Keşan'da  $22.8^{\circ}\text{C}$ , Göztepe'de  $21.7^{\circ}\text{C}$ , Karabük'te  $22.0^{\circ}\text{C}$ , Erbaa'da  $21.8^{\circ}\text{C}$ , en soğuk ay olan Ocak ayında yıllık ortalama sıcaklık Keşan'da  $4.0^{\circ}\text{C}$ , Göztepe'de  $5.4^{\circ}\text{C}$ , Karabük'te  $3.6^{\circ}\text{C}$ , Erbaa'da  $5.4^{\circ}\text{C}$ 'dir.

Akdeniz Bölgesindeki ortalama sıcaklık değerlerinin yukarıdaki sınır değerlerin üstünde bulunduğu yükselti-iklim kuşakları (düsey yayılış) ile yörelerde (yatay yayılış) Kızılçamın orman kurduğu veya ormanların tür bileşimine hakim olarak karıştığı sonucuna varılmaktadır.

**3.7. Sedir ormanlarının yayılış alanındaki iklim değerleri** daha önce incelenmiştir. Bu incelemeye göre Sedirin doğal yayılış alanında yıllık ortalama sıcaklık  $6.0 - 12.5^{\circ}\text{C}$ , yıllık ortalama yağış  $650 - 1400 \text{ mm}$ , dört yaz ayındaki sıcaklık ortalaması  $12.0 - 21.0^{\circ}\text{C}$ , yağış toplamı  $50 - 200 \text{ mm}$ , en soğuk ay olan ocak ayında ortalama sıcaklık  $-4.0/+3.5^{\circ}\text{C}$ , ortalama yağış  $> 75 \text{ mm}$  arasındadır (Kantarci, M.D. 1982 tab. 5). Bu doğal yayılış alanında kişiler karlı iklim tipleri hakimdir. Akdeniz'e bakan yamaçlarda genel olarak 1200 m'den daha yüksekte kar yerde kalabilmektedir. Kar örtüsü sedir tohumunun çimlenebilmesi için gerekli olan soğuk-ıslak katlama işlemini doğal olarak sağlamaktadır. Böylece sedir ormanlarında doğal genleşme kendiliğinden gerçekleşebilmektedir<sup>1)</sup>. Sedir aacı doğal yayılış alanının dışında, hemen her yerde ve Akdeniz kıyısında da, İç Anadolu'da da yetişebilmektedir. Ancak yetiştirebildiği her yerde doğal olarak genleşebilecegi henüz gözlemediği ememiştir. Dikim yolu ile kurulmuş ve yaşlanmış sedir meşcerelerinden sadece Trakya'da Alpullu'daki dikim alanında doğal olarak genleşmenin gerçekleştiği tarafımızdan gözlenmiş ve 1982 hazırlanında yapılmış olan bir ekskürüsyonda meslekdaşlarımıza da gösterilmiştir. Alpullu'daki iklim özellikleri Sedirin doğal yayılış alanındaki iklim özelliklerine benzemektedir (Kantarci, M.D. 1982). Sonuç olarak kar ve karın yerde kalış süresi Sedir kusaqının doğal alt sınırını tayin edici önemli bir faktördür.

**3.8. Kızılıçamın orman kurduğu kuşakta** kişiler ilişkileri sıcak ve karsız, yazıları sıcak ve kurak, iklim tipleri hakimdir. Bu kuşakta deniz ve kara meltemlerinin etkisi ile günün hemen hemen yarısında havanın nisbi nemi yüksek, diğer yarısında ise düşüktür. Yüksek sıcaklık ve havanın nisbi nemindeki belirgin farklar bir yandan kızılıçam kozalaklarının olsunlaşması ve açılıp tohumların saçılması olayı üzerinde, öte yandan da tohumların çimlenme hızı üzerinde olumlu etkiler yapmaktadır.

**Sedir orman kurduğu kuşakta ise**, kişileri soğuk ve karlı, yazları serin ve kurak (veya yarı nemli) iklim tipleri hakimdir. Havannın nisbi nemî denizden yükseklik arttıkça belirgin olarak azalmaktadır. Sedir kuşağındaki iklim farkları ve havannın nisbi neminin yükselti ile azalması birçok varyete ve ökotiplerin ortayamasına sebeb olmuştur (Kantarci, M.D. 1982).

#### 4. SONUC

Akdeniz Bölgesinde yapılmış olan yetişme ortamı bölgesel sınıflandırmasının kısa ve dar çerçeveli bir yorumu yukarıda verilmeğe çalışılmıştır. Daha geniş çerçeveli bir yo-

<sup>3</sup> Laboratuvara T. Odabaşı (1967) tarafından yapılmış olan çimlenme deneyleri sedir tohumunun 1 ay süre ile soğuk-ıslak katlamada tutulması ile çimlenme yüzdesinin arttığını göstermiştir. Ancak genel bu deneylere göre soğuk-ıslak katlama işlemi 3 aya kadar uzatılırsa çimlenme daha fazla ve daha hızlı gerçekleşmektedir. Soğuk-ıslak katlama süresinin uzatılması arazide sedir kuşağındaki doğal şartların etkisi altında doğal genleşmenin durumunu da ortaya koymustur.

rum konumuzun dışında kalmaktadır. Ancak genel olarak aşağıdaki hususlara dikkat çekmenin faydası vardır.

(1) Akdeniz Bölgesinde yapılan yetişme ortamı bölgesel sınıflandırması bilimsel açıdan yöntem gelmesine ve **Akdeniz Ormancılığı'nın** ekolojik esaslarılarındaki bilgilerimizin artmasına yardım etmiştir.

[2] Bölgede açık hava şartlarına yani doğal ekolojik koşullara açık olan ormancılık, tarım, hayvancılık gibi işletmelerin ve bu alanlara yapılacak yatırımların yönlendirilmesi, işletme plânlarının yapılması için temel nitelikte bilgiler elde edilmiştir. Bu bilgiler aynı zamanda bölgedeki turizm, sağlık ve spor alanlarına yapılacak yatırımlara da yardımcı olabilecek niteliktedirler.

(3) Akdeniz Bölgesinde yüksek bir tarım potansiyeli vardır. Yeni tekniklerin kullanılması (sulama, gübreleme, hasere mücadele ve bitki ıslahı gibi) tarımsal üretimi arttırdığı gibi, tarıma dayalı sanayinin de gelişmesini sağlamıştır. Bu yeni tekniklerin daha da geniş alanlarda kullanılması ve geliştirilmesi gerekmektedir. Tarım ürünlerini Akdeniz ve Orta Doğu ülkelerine satabilmekteyiz, Ancak, diğer Akdeniz ülkelerinde de benzer çabalara ve tekniklerle tarımsal üretimin artırılmasına çalışmaktadır. Bu çalışmalar ileriki yıllarda tarım ürünleri satışımızı muhtemelen kısıtlayabilecektir. Akdeniz Bölgesindeki orman alanlarımızın 4.4 milyon ha olduğu ve bu alanın 3.4 milyon ha'nda yeniden orman kurulması gereğine yukarıda değinilmiştir. Akdeniz çevresinde ve özellikle Doğu Akdeniz ile Orta Doğu'da bu ölçüde orman alanı potansiyeline sahip bir başka ülke yoktur. Kısa mesafede bulunan ve ucuz nakliye ile ulaşabileceğimiz bu ülkeler, mamul ve yarı mamul orman ürünlerimiz için sürekli bir pazar durumundadırlar. Hayvancılık bakımından da Akdeniz Bölgesinin kapasitesi çok yüksektir. Orman üstü alanda bulunan geniş otlakların üretim dışı bırakılması düşünülemez ve yaylacılıktan vazgeçilemez. Hayvancılık ile ormançılık arasındaki ilişkilerin iyi planlanması ve bu iki sektörün birbirini olumsuz yönden etkilemeden işletilmesi gerekmektedir.

Sonuç olarak; Akdeniz Bölgemizde mevcut yüksek potansiyel bölgenin ekolojik özelliklerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüksek potansiyelin ormancılık kesiminin de harekete geçirilmesi ve 4.4 milyon ha alanın verimli kılınması bilimsel temellere dayanılarak bir «Akdeniz Ormancılığı» uygulamasının başlatılması ile mümkündür. Akdeniz Ormancılığı ise herhalde bölgede akademik seviyede bir ormancılık öğretim ve eğitimi ile (bir Orman Fakültesi ile) gelişebilecektir.

## KAYNAKLAR

*IRMAK, A., KURTER, A., KANTARCI, M.D. 1980. Trakya'nın orman yetişme bölgelerinin sınıflandırılması. I.U. Yayın No. 2336, Orman Fak. Yayın No. 276 (XVI + 295). Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul.*

**KANTARCI, M.D.**, 1976. Trakya orman mintikalarının bölgesel orman yetişme muhitleri özelliklerine dayanılarak doğal ağaç ve çalı türleri ile sınıflandırılması. 1.U. Orman Fakültesi Dergisi seri A, cilt XXVI, sayı 1 (

KANTARCI, M.D. 1979. *Kuzey Trakya Dağlık Orman Yetişme Bölgesinin yörensel sınıflandırması. I.U. Orman Fakültesi Dergisi* seri A, cilt 29, sayı 2 (42-71).

KANTARCI, M.D. 1980. Belgrad Ormanı toprak tipleri ve yetişme ortamı birimlerinin haritalanması esasları üzerine araşturmalar. İ.Ü. Yayın No. 2635, Orman Fakültesi Yayın No. 275 (XVIII+352). Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul.

KANTARCI, M.D. 1982-1. Akdeniz Bölgesinde doğal ağaç ve çalı türlerinin yayılışı ile bölgesel yetişme ortamı arasındaki ilişkiler. I.Ü. Yayın No. 3054, Orman Fakültesi Yayın No. 330 (VIII+105). Matbaa Teknisyenleri Basımevi, İstanbul.

KANTARCI, M.D. 1982-2. Türkiye sedirleri (*Cedrus libani A. Richard*) ve doğal yayılış alanında bazı ekolojik ilişkiler. İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi seri A, cilt 32, sayı 2 (113 - 198).

KANTARCI, M.D. 1984. Akdeniz Bölgesinin yetişme ortamı bölgesel sınıflandırması TÜBİTAK, TOAG - 516 No. lu araştırma projesi (VIII+142), Özeti Doğa Dergisi.

ODABAŞI, T. 1967. Lübnan Sediri (*Cedrus libani Loud.*) kozalak ve tahumu üzerine araştırmalar (Doktora Tezi - basılmamıştır).

Tablo 1.1. Akdeniz Bölgesi'nde ayırdedilen yetişme ortamı bölge ve yörenlerinin iklim özellikleri  
 Tabelle 1.1. Klimatische Eigenschaften der Wuchsgebiete und Wuchsbezirke in Mittelmeer-Gebiet der Türkei

Bölgesel Birimler	Yükselti						Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %			
<b>1. Deniz Etkisine Açık Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu</b> (Wuchsgebietsgruppe unter dem Meereseffekt)																		
<b>1.1. Batı Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgeleri</b> (Wuchsgebiet Westlicher Teil vom Mittelmeer gebiet)																		
<b>1.1.1. Kıyı Kuşağı</b> (Küstengürtel)	< 100	18.-19.0	1000-1250															
1.1.1.1. Marmaris - Eşen Yöresi	(Wb)			—	10-11-12	YN-N-ÇN	25.3-26.4	22-45	42-63	9.5-10.6	226-280	60-76						
					375													
1.1.1.2. Kalkan-Finike Yöresi	(Wb.)	20.0	850-1000	—	12-2/150	YN-N	26.4-26.7	15-30	42-47	10.1-12.6	210-260	50						
1.1.1.3. Finike-Kumluka Yöresi	(Wb.)	18.6	900-1050	—	1/206	N	25.6	17-19	50	11.3	280-330	63						
1.1.1.4. Kemer-Çakırılar Yöresi	(Wb.)	18.5-19.0	1490-1570	—	12/387	ÇN	26.6	32-72		10.1-11.3	295-337							
1.1.1.5. Antalya Yöresi	(Wb.)	18.0-19.0	900-1100	—	11-12-1	N	26.6	28-41	57	10.0-10.5	195-244	60						
					90-332													
1.1.1.6. Manavgat-Demirtaş Yöresi	(Wb.)	18.0-19.0	1000-1300	—	1-2	N	25.6-25.7	30-32	56-64	10.5-11.6	210-310	58-62						
					71-204													
1.1.1.7. Gazipaşa-Anamur Yöresi	(Wb.)	19.0-20.0	800-1050	—	10/169	YN-N	26.9	18-32	54	11.7	163-221	63						
<b>I.1.2. Kızılıçam alt kuşağı</b>	100-500	(Untere Hartkieferngürtel)																
I.1.2.1. Dalaman-Koca Çay-Alakır Çayı																		
yörensi	(Wb.)	16.0-18.0	900-1250	0.1-02	10-12-2	YN-N-ÇN				27-60		7.5-10.5	164-293					
					87-178													
I.1.2.2. Antalya-Anamur Yöresi	(Wb.)	16.5-18.5	1100-1800		9-12-2	N-ÇN				14-84		9.0-10.0	246-417					
					94-303													

\* Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

Tablo 1.1. (Devam) (Forstetzung Tabelle 1.1.)

Bölgesel Birimler	Yükselti		Yıllık Değerler					Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %
<b>1.1.3. Kızılıçam Orta Kuşağı</b>	500-1000	Hartkieferngürtel)											
1.1.3.1. Nifköy-Gödene Yöresi	(Wb.)	13.4-14.1	897-1564		12		N-ÇN		50-85		3.2-6.8	154-432	
1.1.3.2. Tahtalı Dağları Doğusu-Bük					108-185								
Yöresi	(Wb.)		568										
1.1.3.3. Aşağı Gökdere-Kovada Yöresi	(Wb.)	12.5-14.1	744-1382	2-10	90-100	YN-N-ÇN	21.6-23.1	87-183			2.5-3.5	140-246	
1.1.3.4. Köprü Çayı Vadisi Yöresi	(Wb.)	16.5	1797			ÇN							
(1) Doğu Bakılı Yamaçlar Alt Yöresi (Teibeziirk Ostabfall)													
(2) Batı Bakılı Yamaçlar Alt Yöresi (Teilbezirk Westabfall)													
1.1.3.5. İbradı (Aydinkent)-Köprülü							ÇN		40-70		1.8-7.0	310-505	
Yöresi	(Wb.)	12-13.6	1380-2188										
<b>1.1.4. Kızılıçam-Sedir Kuşağı</b>	1000-1500	11.5-12.5	1350-2160	2-21	11-12		ÇN	20.7-22.5	67-87	28-45	1.6-3.1	154-505	66-78
					102-113								
1.1.4.1. Kızılıçam Üst Kuşağı	1000-1200	(Obere Hartkieferngürtel)											
1.1.4.2. Sedir Alt Kuşağı	1200-1500	(Untere Zederngürtel)											
<b>1.1.5. Sedir Orta Kuşağı</b>	1500-1750	(Mittlere Zederngürtel)											
(Yaklaşık Arslanköy)		10.4	814	52	11/56	N	19.3	98	46	0.0	117	71	
<b>1.1.6. Sedir Üst Kuşağı</b>	1750-2000	(Obere Zederngürtel)											
<b>1.1.7. Orman Üstü (Kir-Alp) Kuşağı</b>	> 2000												
1.1.7.1. Otlaklar (Kir) Kuşağı	2000-2500	(Almen-Gürtel)											
1.1.7.2. Alp Kuşağı	> 2500	(Alpin-Gürtel)											

Tablo 1.2. (Tabelle 1.2)

Ölgesel Birimler	Yükselti		Yıllık Değerler					Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %
<b>2. Doğu Akdeniz Yetişme Ortası Bölgesi</b>													
<b>2.1. Kıyı Kuşağı</b>	< 100	(Küstengürtel)											
2.1.1. Anamur-Taşucu Yöresi	(Wb.)	19.0-19.6	805-1033	—		YN		8	54	11.7	207	64	
				—	4.-11.								
2.1.2. Silifke-Erdemli Yöresi	(Wb.)	18.4-19.0	636- 731	—	48-246	YN	26.1-26.7	19	58-61	10.2-10.3	138-182	56-59	
				—	11.-12.								
2.1.3. Mersin-Adana Yöresi	(Wb.)	18.5	560- 841	—	112-200	YN	26.3-26.5	32-94	44-69	9.3- 9.5	111-114	53-62	
				—	5.-12.								
2.1.4. Karataş-Yumurtalık Yöresi	(Wb.)	18.7-18.9	700- 890	—	125-211	YN	26.0-26.5	32-48	61-64	9.3-10.4	131-208	58-59	
2.1.5. Ceyhan Yöresi	(Wb.)	18.3-19.0	625- 735	—	12./94-180	YN	26.4	56-108	47	8.6-10.2	87-144	53	
2.1.6. Dörtyol-Samandağı Yöresi	(Wb.)												
(1). Dörtyol Alt Yöresi		19.3-19.8	1022-1083	—	11./207	N	26.6	174-202	53	10.4-11.1	125	53	
(2). İskenderun-Arsuz Alt Yöresi		19.6-20.2	704- 785	—	2.-12.	YN	26.8-27.2	44-76	60-61	11.5-11.9	105-124	60-61	
				—	101-155								
(3). Samandağı Alt Yöresi	(Wb.)	19.6	1009	—	12./130	N	25.9	82	73	9.1	185	68	
2.1.7. Antakya Yöresi	(Wb.)	18.2	1173	—	5./236	N	26.2	82	67	8.1	222	76	

\*) Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

Tabello 1.2. (Devam) (Fortsetzung Tabelle 1.2.)

Bölgesel Birimler	Yükselti	Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
		m	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Aydı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %
1.2.2. Kızılıçam Alt Kuşağı	100-500	(Untere Hartkieferngürtel)											
1.2.2.1. Anamur-Taşucu Kuzeyi Yöreni (Wb.)													
1.2.2.2. Silifke-Erdemli Kuzeyi Yöreni (Wb.)													
1.2.2.3. Mut-Göksu Vadisi Yöreni (Wb.)	17.3	419	—				YK	27.0	27	32	6.3	84	60
(1). Göksu Vadisi Kuzeyi Alt Yöreni													
(2). Göksu Vadisi Güneyi Alt Yöreni													
1.2.2.4. Yukarı Çukurova Yöreni (Wb.)	18.0-19.3	760- 930 (1234)	—	6.-11.-12. 55-217		YN-N	26.1-27.4	42-167	35-45	7.9-10.2	70-200	51-57	
1.2.2.5. Kabalıçık-Dörtyol Yöreni (Wb.)	17.7-19.3	1022-1159	—	9./76-207	N				174-195		8.8-10.4	125-152	
1.2.2.6. İskenderun-Arsuz Kuzeyi Yöreni (Wb.)	18.2	877	—	4./103	N				89		9.9	112	
1.2.2.7. Samandağı-Yayladağı Yöreni (Wb.)	17.4	1180	—	N					54		9.3	224	
1.2.2.8. Dede Dağ (Çukurova) Yöreni (Wb.)													
1.2.3. Kızılıçam Orta Kuşağı	500-1000	(Mittlere Hartkieferngürtel)											
1.2.3.1. Gülnar Yöreni (Wb.)	13.7	935	2.5			N			18		6.7	231	
1.2.3.2. Göksu Vadisi-Sarıkavak Yöreni (Wb.)	14.3	488				YK			24		3.3	112	
1.2.3.3. Akarca-Çamiliyayla Yöreni (Wb.)	14.5-15.7	1118-1262	12	1./68					99-116		5.5- 6.2	170-250	
1.2.3.4. Çukurova Kuzeyi Yöreni (Wb.)													
(1). Gülek-Karsanti Alt Yöreni	13.8-15.6	947-1125	1-9	2.-12. 88-184	N	22.1-24.5	66-90	47-50	3.1- 5.0	153-205	58-60		
(2). Pozantı-Mansurlu-Yardibi Alt Yöreni	13.5-13.8	703- 939	4.4	11./35	YK-YN-N	22.8	58-69	35	2.8- 3.2	96-152	59		
1.2.3.5. Bahçe-Belen-Şenköy Yöreni (Wb.)													
(1). Bahçe-Yarpuz Alt Yöreni	11.3-13.8	840-1088	15		N-ÇN	20.3	69-170	58	2.7- 4.2	130-164	70		
(2). Moduk-Seydihan Yaylası Alt Yöreni	15.0	1190-1283		3./82-86	ÇN		96-227		6.1- 6.6	61-182			
(3). Soğukoluk-Belen Alt Yöreni	16.2-17.2	681-1371	4	4.-8.	YN-ÇN		99-243		7.9- 9.0	35-169			
(4). Bezge-Senköy Alt Yöreni	15.2-16.7	1102		94-114	N		80		5.1- 8.4	231			

Tabelle 1.2 (Fortsetzung Tabelle 1.2)

Tablo 1.3. (Tabelle 1.3.)

Bölgesel Birimler	Yükselti		Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	
<b>2. Akdeniz İç Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu (Wuchsgebietsgruppe inneren Mittelmeer-Gebiet)</b>														
<b>2.1. Elmalı-Korkuteli-Bucak Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Elmalı-Korkuteli-Bucak)</b>														
2.1.1. Elmalı Yöresi (Wuschsbezirk Elmalı)			12.7	658- 894		12./100	YN-N		36-48		2.5	148-188		
2.1.1.2. Elmalı Alt Yöresi	1000-1500	11.8-12.7	542- 683	11.16.4	1./65-80	YN		22.2	46-61	24	1.6-2.5	119-132	56	
2.1.1.3. Dokuz Göl-Çılgıklara Alt Yöresi		> 1500												
2.1.1.4. Çamkuyusu Alt Yöresi		> 1500	7.6	817	34		N	15.9	65	49	-2.5	123	57	
2.1.1.5. Göğü Alt Yöresi		> 1500												
2.1.2. Korkuteli-Bucak Yöresi (Wuchsbezirk Korkuteli-Bucak)														
2.1.2.1. Bozova-Bucak Alt Yöresi	< 1000	13.7-14.3	489- 744	6-32			YN	23.1	51-88	27	1.6-3.5	78-140	68	
2.1.2.2. Korkuteli-Yeleme Alt Yöresi	> 1000	10.6-12.2	332- 546	8.5-20.1	4./47-61		YK-YN		33-63		0.4-2.5	47- 77		
2.1.2.3. Ağlasun Alt Yöresi	> 1000	11.7-12.1	678- 947	10.8	12.-1.		YN-N		44-88		1.3-1.5	113-184		
						50-77								
<b>2.2. Acıpayam-Gölhisar-Tefenni Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Acıpayam-Gölhisar-Tefenni)</b>														
2.2.1. Acıpayam Yör. (Wuchsbezirk Acıpayam)	11.7-12.4	539- 668	28-33		11.-2.	YN		21.6	42-57	29	1.4-3.7	81-150	65	
					61-73									
2.2.2. Gölhisar Yöresi (Wuchsbezirk Gölhisar)														
2.2.2.1. Gölhisar Alt Yöresi	> 1000	12.1-13.2	447- 790	9-18	1.-2.-5.-10.		YK-YN-N	21.4	10-79	26	1.9-2.7	60-127	61	
					39-75									
2.2.2.2. Dirmil Alt Yöresi	> 1000	12.1-13.2	1000-1276	17.5		12./90	N-ÇN		69-96		1.9-3.0	195-246		
2.2.3. Söğüt Gölü Yöresi (Wuchsbezirk Söğütgölü)	1400-2000	10.8-11.1	414- 499	23-28		12./47	YN		30-69		0.6-0.9	41- 61		
2.2.4. Tefenni Yöresi (Wuchsbezirk Tefenni)	11.6-12.0	288- 542	11-14		5.-10.-11.		YK-YN	25.2	44-64	43	0.5-1.1	34- 85	75	
					36-102									

\*) Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

Tablo 1.4. (Tabelle 1.4.)

Bölgesel Birimler	Yükselti		Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	
<b>3. Göl Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu (Wuchsgebietsgruppe Innenseeenteil vom Mittelmeer-Gebiet)</b>														
<b>3.1. Burdur-Açılı Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Burdur-Açılı)</b>														
3.1.1. Burdur Yöresi (Wuschsbezirk Burdur)	12.1-13.8	364-542	5-11	4.-7.-12.			YK-YN	22.3	50-57	25	1.3-3.0	49- 65	6	
3.1.2. Açı Göl Yöresi (Wuchsbezirk Açıgöl)	13.6-13.8	386-440			42-108		YK		56-64		2.9-3.0	48- 64		
3.1.3. Salda Gölü Yöresi (Wuchsbezirk Salda Gölü)	11.8-12.7	350-450	8-12	4.-7.-10.			YK-YN		39-63		1.1-1.3	36- 70		
				37-58										
<b>3.2. Eğridir Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Eğridir).</b>														
3.2.1. Senirkent Yöresi (Wb.)	Senirkent	12.2-12.7	364-740	8-16	2.-3./42-81		YK-YN	21.0-21.5	50-102	27-40	1.6-2.3	44-110	62-6	
3.2.2. Yalvaç-Sultan Dağları Yöresi (Wb.)		10.6-11.8	433-470	17-26	1.-3./40-64		YN-N	20.6	48-84	45	-0.3/+0.6	68- 97	7	
3.2.3. Bozanönü-Atabey Yöresi (Wb.)		11.9-12.5	457-563	4.3-6	1.-5.-10.		YN	21.5	37-59	25	1.5-2.0	58- 99	6	
3.2.4. Isparta-Eğridir Yöresi (Wb.)					22-57									
3.2.4.1. Isparta Alt Yöresi		8.5-12.2	620-990	15-25	12.-1.		YN-N-ÇN	21.1	73-79	33	-2.0/+1.8	94-167	7	
3.2.4.2. Eğridir Alt Yöresi		12.3-13.5	674-928	5-20	12.-2.		N	22.4	64-76	34	2.2-3.4	127-164	7	
				97-178										
<b>3.3. Beyşehir-Suyla Gölü Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Beyşehir-Suyla Gölü)</b>														
3.3.1. Dedegöl Dağları Yöresi (Wb.)		9.4-11.3	898-910				N-ÇN		79-84		-2.0/+0.5	150-167		
3.3.2. Beyşehir-Sultan Dağları Yöresi (Wb.)		10.4-11.6	445-532	20	12./68		YN	20.0	40-66	40	-0.4/+3.0	66- 92	6	
3.3.3. Suyla Gölü Yöresi (Wb.)		11.4-11.6	598-772	23	1./86		YN-N	20.6	42-58	26	2.8-3.0	120-160	6	
3.4. Akşehir Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Akşehir)		11.1-13.3	389-680	19-25	11.-12.		YK-YN	19.7-20.8	81-102	38-53	0.6-3.0	35- 94	68-6	
				62-182										

\*) Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

**Tablo 1.1. Akdeniz Bölgesi'nde ayırdedilen yetişme ortamı bölge ve yörenlerinin iklim özellikleri**  
**Tabelle 1.1. Klimatische Eigenschaften der Wuchsgebiete und Wuchsbezirke in Mittelmeer-Gebiet der Türkei**

Bölgesel Birimler	Yükselti m						Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %				
<b>1. Deniz Etkisine Açık Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu (Wuchsgebietsgruppe unter dem Meereseffekt)</b>																		
<b>1.1. Batı Akdeniz Yetişme Ortamı Bölgeleri (Wuchsgebiet Westlicher Teil vom Mittelmeer gebiet)</b>																		
<b>1.1.1. Kıyı Kuşağı (Küstengürtel)</b>	< 100	18.-19.0	1000-1250															
1.1.1.1. Marmaris - Eşen Yöresi	(Wb.)			—	10-11-12	YN-N-ÇN	25.3-26.4	22-45	42-63	9.5-10.6	226-280	60-76						
					375													
1.1.1.2. Kalkan-Finike Yöresi	(Wb.)	20.0	850-1000	—	12-2/150	YN-N	26.4-26.7	15-30	42-47	10.1-12.6	210-260	50						
1.1.1.3. Finike-Kumluka Yöresi	(Wb.)	18.6	900-1050	—	1/206	N	25.6	17-19	50	11.3	280-330	63						
1.1.1.4. Kemer-Çakırılar Yöresi	(Wb.)	18.5-19.0	1490-1570	—	12/387	ÇN	26.6	32-72		10.1-11.3	295-337							
1.1.1.5. Antalya Yöresi	(Wb.)	18.0-19.0	900-1100	—	11-12-1	N	26.6	28-41	57	10.0-10.5	195-244	60						
					90-332													
1.1.1.6. Manavgat-Demirtaş Yöresi	(Wb.)	18.0-19.0	1000-1300	—	1-2	N	25.6-25.7	30-32	56-64	10.5-11.6	210-310	58-62						
					71-204													
1.1.1.7. Gazipaşa-Anamur Yöresi	(Wb.)	19.0-20.0	800-1050	—	10/169	YN-N	26.9	18-32	54	11.7	163-221	63						
<b>1.1.2. Kızılıçam alt kuşağı</b>	100-500	(Untere Hartkieferngürtel)																
<b>1.1.2.1. Dalaman-Koca Çay-Alakır Çayı</b>																		
yörensi	(Wb.)	16.0-18.0	900-1250	0.1-02	10-12-2	YN-N-ÇN				27-60		7.5-10.5	164-293					
					87-178													
<b>1.1.2.2. Antalya-Anamur Yöresi</b>	(Wb.)	16.5-18.5	1100-1800		9-12-2	N-ÇN				14-84		9.0-10.0	246-417					
					94-303													

\* Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

Tablo 1.1. (Devam) (Forstetzung Tabelle 1.1.)

Bölgesel Birimler	Yükselti		Yıllık Değerler					Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %
<b>1.1.3. Kızılıçam Orta Kuşağı</b>	500-1000	Hartkieferngürtel)											
1.1.3.1. Nifköy-Gödene Yöresi	(Wb.)	13.4-14.1	897-1564		12		N-ÇN		50-85		3.2-6.8	154-432	
1.1.3.2. Tahtalı Dağları Doğusu-Bük					108-185								
Yöresi	(Wb.)		568										
1.1.3.3. Aşağı Gökdere-Kovada Yöresi	(Wb.)	12.5-14.1	744-1382	2-10	90-100	YN-N-ÇN	21.6-23.1	87-183			2.5-3.5	140-246	
1.1.3.4. Köprü Çayı Vadisi Yöresi	(Wb.)	16.5	1797			ÇN							
(1) Doğu Bakılı Yamaçlar Alt Yöresi (Teibeziirk Ostabfall)													
(2) Batı Bakılı Yamaçlar Alt Yöresi (Teilbezirk Westabfall)													
1.1.3.5. İbradı (Aydinkent)-Köprülü							ÇN		40-70		1.8-7.0	310-505	
Yöresi	(Wb.)	12-13.6	1380-2188										
<b>1.1.4. Kızılıçam-Sedir Kuşağı</b>	1000-1500	11.5-12.5	1350-2160	2-21	11-12		ÇN	20.7-22.5	67-87	28-45	1.6-3.1	154-505	66-78
					102-113								
1.1.4.1. Kızılıçam Üst Kuşağı	1000-1200	(Obere Hartkieferngürtel)											
1.1.4.2. Sedir Alt Kuşağı	1200-1500	(Untere Zederngürtel)											
<b>1.1.5. Sedir Orta Kuşağı</b>	1500-1750	(Mittlere Zederngürtel)											
(Yaklaşık Arslanköy)		10.4	814	52	11/56	N	19.3	98	46	0.0	117	71	
<b>1.1.6. Sedir Üst Kuşağı</b>	1750-2000	(Obere Zederngürtel)											
<b>1.1.7. Orman Üstü (Kir-Alp) Kuşağı</b>	> 2000												
1.1.7.1. Otlaklar (Kir) Kuşağı	2000-2500	(Almen-Gürtel)											
1.1.7.2. Alp Kuşağı	> 2500	(Alpin-Gürtel)											

Tablo 1.2. (Tabelle 1.2)

Ölgesel Birimler	Yükselti		Yıllık Değerler					Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
	m		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %
<b>2. Doğu Akdeniz Yetişme Ortası Bölgesi</b>													
<b>2.1. Kıyı Kuşağı</b>	< 100	(Küstengürtel)											
2.1.1. Anamur-Taşucu Yöresi	(Wb.)	19.0-19.6	805-1033	—		YN		8	54	11.7	207	64	
				—	4.-11.								
2.1.2. Silifke-Erdemli Yöresi	(Wb.)	18.4-19.0	636- 731	—	48-246	YN	26.1-26.7	19	58-61	10.2-10.3	138-182	56-59	
				—	11.-12.								
2.1.3. Mersin-Adana Yöresi	(Wb.)	18.5	560- 841	—	112-200	YN	26.3-26.5	32-94	44-69	9.3- 9.5	111-114	53-62	
				—	5.-12.								
2.1.4. Karataş-Yumurtalık Yöresi	(Wb.)	18.7-18.9	700- 890	—	125-211	YN	26.0-26.5	32-48	61-64	9.3-10.4	131-208	58-59	
2.1.5. Ceyhan Yöresi	(Wb.)	18.3-19.0	625- 735	—	12./94-180	YN	26.4	56-108	47	8.6-10.2	87-144	53	
2.1.6. Dörtyol-Samandağı Yöresi	(Wb.)												
(1). Dörtyol Alt Yöresi		19.3-19.8	1022-1083	—	11./207	N	26.6	174-202	53	10.4-11.1	125	53	
(2). İskenderun-Arsuz Alt Yöresi		19.6-20.2	704- 785	—	2.-12.	YN	26.8-27.2	44-76	60-61	11.5-11.9	105-124	60-61	
				—	101-155								
(3). Samandağı Alt Yöresi	(Wb.)	19.6	1009	—	12./130	N	25.9	82	73	9.1	185	68	
2.1.7. Antakya Yöresi	(Wb.)	18.2	1173	—	5./236	N	26.2	82	67	8.1	222	76	

\*) Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

Tablo 1.2. (Devam) (Fortsetzung Tabelle 1.2.)

Bölgesel Birimler	Yükselti	Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
		m	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Aydı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %
1.2.2. Kızılıçam Alt Kuşağı	100-500	(Untere Hartkieferngürtel)											
1.2.2.1. Anamur-Taşucu Kuzeyi Yöreni (Wb.)													
1.2.2.2. Silifke-Erdemli Kuzeyi Yöreni (Wb.)													
1.2.2.3. Mut-Göksu Vadisi Yöreni (Wb.)	17.3	419	—				YK	27.0	27	32	6.3	84	60
(1). Göksu Vadisi Kuzeyi Alt Yöreni													
(2). Göksu Vadisi Güneyi Alt Yöreni													
1.2.2.4. Yukarı Çukurova Yöreni (Wb.)	18.0-19.3	760- 930 (1234)	—	6.-11.-12. 55-217		YN-N	26.1-27.4	42-167	35-45	7.9-10.2	70-200	51-57	
1.2.2.5. Kabalıçık-Dörtyol Yöreni (Wb.)	17.7-19.3	1022-1159	—	9./76-207	N				174-195		8.8-10.4	125-152	
1.2.2.6. İskenderun-Arsuz Kuzeyi Yöreni (Wb.)	18.2	877	—	4./103	N				89		9.9	112	
1.2.2.7. Samandağı-Yayladağı Yöreni (Wb.)	17.4	1180	—	N					54		9.3	224	
1.2.2.8. Dede Dağ (Çukurova) Yöreni (Wb.)													
1.2.3. Kızılıçam Orta Kuşağı	500-1000	(Mittlere Hartkieferngürtel)											
1.2.3.1. Gülnar Yöreni (Wb.)	13.7	935	2.5			N			18		6.7	231	
1.2.3.2. Göksu Vadisi-Sarıkavak Yöreni (Wb.)	14.3	488				YK			24		3.3	112	
1.2.3.3. Akarca-Çamiliyayla Yöreni (Wb.)	14.5-15.7	1118-1262	12	1./68					99-116		5.5- 6.2	170-250	
1.2.3.4. Çukurova Kuzeyi Yöreni (Wb.)													
(1). Gülek-Karsanti Alt Yöreni	13.8-15.6	947-1125	1-9	2.-12. 88-184	N	22.1-24.5	66-90	47-50	3.1- 5.0	153-205	58-60		
(2). Pozantı-Mansurlu-Yardibi Alt Yöreni	13.5-13.8	703- 939	4.4	11./35	YK-YN-N	22.8	58-69	35	2.8- 3.2	96-152	59		
1.2.3.5. Bahçe-Belen-Şenköy Yöreni (Wb.)													
(1). Bahçe-Yarpuz Alt Yöreni	11.3-13.8	840-1088	15		N-ÇN	20.3	69-170	58	2.7- 4.2	130-164	70		
(2). Moduk-Seydihan Yaylası Alt Yöreni	15.0	1190-1283		3./82-86	ÇN		96-227		6.1- 6.6	61-182			
(3). Soğukoluk-Belen Alt Yöreni	16.2-17.2	681-1371	4	4.-8.	YN-ÇN		99-243		7.9- 9.0	35-169			
(4). Bezge-Senköy Alt Yöreni	15.2-16.7	1102		94-114	N		80		5.1- 8.4	231			

Table 1.2 (Devam) (Fortsetzung Tabelle 1.2)

Tablo 1.3. (Tabelle 1.3.)

Bölgesel Birimler	Yükselti	Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
		m	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Aylı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %
<b>2. Akdeniz İç Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu (Wuchsgebietgruppe Inneren Mittelmeer-Gebiet)</b>													
<b>2.1. Elmalı-Korkuteli-Bucak Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Elmalı-Korkuteli-Bucak)</b>													
2.1.1. Elmalı Yöresi (Wuchsbezirk Elmalı)													
2.1.1.1. Gömbe Alt Yöresi		12.7	658-	894		12./100	YN-N		36-48		2.5	148-188	
2.1.1.2. Elmalı Alt Yöresi	1000-1500	11.8-12.7	542-	683	11.16.4	1./65-80	YN	22.2	46-61	24	1.6-2.5	119-132	
2.1.1.3. Dokuz Göl-Çiglikara Alt Yöresi		> 1500											
2.1.1.4. Çamkuyusu Alt Yöresi		> 1500	7.6	817	34		N	15.9	65	49	-2.5	123	
2.1.1.5. Göğü Alt Yöresi		> 1500											
2.1.2. Korkuteli-Bucak Yöresi (Wuchsbezirk Korkuteli-Bucak)													
2.1.2.1. Bozova-Bucak Alt Yöresi	< 1000	13.7-14.3	489-	744	6-32		YN	23.1	51-88	27	1.6-3.5	78-140	
2.1.2.2. Korkuteli-Yeleme Alt Yöresi	> 1000	10.6-12.2	332-	546	8.5-20.1	4./47-61	YK-YN		33-63		0.4-2.5	47- 77	
2.1.2.3. Ağlasun Alt Yöresi	> 1000	11.7-12.1	678-	947	10.8	12.-1.	YN-N		44-88		1.3-1.5	113-184	
						50-77							
<b>2.2. Acıpayam-Gölhisar-Tefenni Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Acıpayam-Gölhisar-Tefenni)</b>													
2.2.1. Acıpayam Yör. (Wuchsbezirk Acıpayam)	11.7-12.4	539-	668	28-33	11.-2.	YN		21.6	42-57	29	1.4-3.7	81-150	
					61-73								
2.2.2. Gölhisar Yöresi (Wuchsbezirk Gölhisar)													
2.2.2.1. Gölhisar Alt Yöresi	> 1000	12.1-13.2	447-	790	9-18	1.-2.-5.-10.	YK-YN-N	21.4	10-79	26	1.9-2.7	60-127	
					39-75								
2.2.2.2. Dirmil Alt Yöresi	> 1000	12.1-13.2	1000-1276	17.5		12./90	N-ÇN		69-96		1.9-3.0	195-246	
2.2.3. Söğüt Gölü Yöresi (Wuchsbezirk Söğütgölü)	1400-2000	10.8-11.1	414-	499	23-28	12./47	YN		30-69		0.6-0.9	41- 61	
2.2.4. Tefenni Yöresi (Wuchsbezirk Tefenni)	11.6-12.0	288-	542	11-14	5.-10.-11.	YK-YN		25.2	44-64	43	0.5-1.1	34- 85	
					36-102								

\*) Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)

Tablo 1.4. (Tabelle 1.4.)

Bölgesel Birimler	Yükselti	Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
		m	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Aylı mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi Nem %
<b>3. Göller Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu (Wuchsgebietgruppe Innensee-Teil vom Mittelmeer-Gebiet)</b>													
<b>3.1. Burdur-Açılı Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Burdur-Açılı)</b>													
3.1.1. Burdur Yöresi (Wuchsbezirk Burdur)	12.1-13.8	364-542	5-11	4.-7.-12.		YK-YN		22.3	50-57	25	1.3-3.0	49- 65	
3.1.2. Açılı Göl Yöresi (Wuchsbezirk Açılı)	13.6-13.8	386-440		42-108		YK			56-64		2.9-3.0	48- 64	
3.1.3. Salda Gölü Yöresi (Wuchsbezirk Salda Gölü)	11.8-12.7	350-450	8-12	4.-7.-10.		YK-YN			39-63		1.1-1.3	36- 70	
3.1.3. Salda Gölü Yöresi (Wuchsbezirk Salda Gölü)				37-58									
<b>3.2. Eğirdir Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Eğridir).</b>													
3.2.1. Senirkent Yöresi (Wb.)	Senirkent	12.2-12.7	364-740	8-16	2.-3./42-81	YK-YN	21.0-21.5	50-102	27-40	1.6-2.3	44-110	62-	
3.2.2. Yalvaç-Sultan Dağları Yöresi	(Wb.)	10.6-11.8	433-470	17-26	1.-3./40-64	YN-N	20.6	48-84	45	-0.3/+0.6	68- 97		
3.2.3. Bozanönü-Atabey Yöresi	(Wb.)	11.9-12.5	457-563	4.3-6	1.-5.-10.	YN	21.5	37-59	25	1.5-2.0	58- 99		
3.2.4. Isparta-Eğirdir Yöresi	(Wb.)				22-57								
3.2.4.1. Isparta Alt Yöresi		8.5-12.2	620-990	15-25	12.-1.	YN-N-ÇN	21.1	73-79	33	-2.0/+1.8	94-167		
3.2.4.2. Eğirdir Alt Yöresi		12.3-13.5	674-928	5-20	12.-2.	N	22.4	64-76	34	2.2-3.4	127-164		
3.2.4.2. Eğirdir Alt Yöresi					97-178								
<b>3.3. Beyşehir-Suyla Gölü Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Beyşehir-Suyla Gölü)</b>													
3.3.1. Dedegöl Dağları Yöresi	(Wb.)	9.4-11.3	898-910			N-ÇN		79-84		-2.0/+0.5	150-167		
3.3.2. Beyşehir-Sultan Dağları Yöresi	(Wb.)	10.4-11.6	445-532	20	12./68	YN	20.0	40-66	40	-0.4/+3.0	66- 92		
3.3.3. Suyla Gölü Yöresi	(Wb.)	11.4-11.6	598-772	23	1./86	YN-N	20.6	42-58	26	2.8-3.0	120-160		
3.4. Akşehir Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Akşehir)		11.1-13.3	389-680	19-25	11.-12.	YK-YN	19.7-20.8	81-102	38-53	0.6-3.0	35- 94	68-	
3.4. Akşehir Yetişme Ortamı Bölgesi (Wuchsgebiet Akşehir)					62-182								

\*) Saat 14'teki nisbi nem

(M. Doğan Kantarcı)


Tablo 1.5. (Tabelle 1.5.)

Bölgesel Birimler	Yükselti m	Yıllık Değerler						Dört Yaz Ayı Değerleri			Ocak Ayı Değerleri		
		Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Karla Örtülü Gün Sayısı	Günlük En Yüksek Yağış ve Ayi mm/24 saat	İklim Tipi	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	Ortalama Sıcaklık C°	Ortalama Yağış mm	Nisbi %	
<b>4. Akdeniz Ardı Yetişme Ortamı Bölgeleri Grubu (Wuchsgebietgruppe hinterer Teil vom Mittelmeergebiet)</b>													
<b>4.1. Batı Toros Ardı Yetişme Ortamı Bölgesi</b> (Wuchsgebiet hinterer teil vom westlichen Taurus).													
4.1.1. Bozkır-Bucaklışa Yöresi	(Wb.)	9.8-11.4	414-562	7-21	12./44	YN	20.6	30-39	31	-0.3/+0.7	75-105	6	
4.1.2. Hadim-Taşkent Yöresi	(Wb.)	9.5-10.3	654-805	37-47	2.-4./53-81	N	18.7	33-75	32	-1.5/-0.7	122-159	6	
<b>4.2. Orta Toros Ardı Yetişme Ortamı Bölgesi</b> (Wuchsgebiet hinterer Teil vom mittleren Taurus)													
4.2.1. Bolkar Dağları Kuzeyi Yöresi	(Wb.)	10.1-11.8	262-403	21-41	5.-7.-11.	K-YK	19.8-20.6	20-47	26-31	-1.9/+1.3	27- 94	61-7	
(Eteklerdeki İstasyonların Değerleri verilmiştir).													
4.2.2. Pozantı Dağı Yöresi	(Wb.)	7.8-11.6	428-564	19-61	12./53-119	YN	14.1	43-81	52	-3.8/+0.3	40- 65	7	
4.2.3. Bakırdağı (Taşçı) Yöresi	(Wb.)	8.5- 9.0,	366-446	48	12/70		17.6	56-72	49	-2.9/-2.4	45- 48	7	
<b>4.3. Amanos-Toros Ardı Yetişme Ortamı Bölgesi</b> (Wuchsgebiet hinterer Teil vom Amanos-Taurus)													
4.3.1. Amanos Ardı Yöresi	(Wb.)												
4.3.1.1. Amik Gölü Alt Yöresi		13.7-18.2	830-860			YN-N		18-36		5.1-5.8	189-200		
4.3.1.2. Kırıkkale-Reyhanlı Alt Yöresi		18.9-19.3	525-576	0.4	2./75	YK	28.0	8-11	43	7.8-8.2	97-129	7	
4.3.1.3. Hassa-İslâhiye Alt Yöresi		15.5-17.2	657-1170	2.8	3.-5.-11.	YN-CN	26.2	6-30	50	4.0-5.7	134-179	7	
4.3.1.4. Reyhanlı-Kilis Alt Yöresi		16.9-19.3	525-543	3.3	2./79	YK	26.4	11-12	45	5.4-8.2	97-108	7	
4.3.2. Amanos-Toros Ardı Yöresi	(Wb.)												
4.3.2.1. Kahraman Maraş Alt Yöresi		14.5-17.0	678-998	3-14	3.-10.-11.-12.	YN-N	26.6	14-50	48	3.0-5.0	130-170	72	
4.3.2.2. Narlı-Pazarcık Alt Yöresi		15.2-16.2	521-608		53-83			14-23		3.9-4.6	68-110		
4.3.2.3. Göksun Alt Yöresi		9.4	593	64	3.-5.	YK-YN			56	-2.5	95	81	

\*) Saat 14'teki nisbi nem


(M. Doğan Kantarcı)

Kesit 1. Manavgat (Karpuz Çayı) - Murtiçi - Akseki - Cevizli - Beyşehir Gölü kesitinde ağaç ve çalı türlerinin yayılışı  
 (Querscht. 1. Verbreitung der Baum- und Straucharten im Querschnitt vom Mittelmeer bis zur Beyşehir-See)



**Kesit 2. Alanya - Söğüt Dağı - Gevne - Hadim - Çiçek Kesitinde ağaç ve çalı türleri**

**(Quersch. 2. Verbreitung der Baum- und Straucharten im Querschnitt von Alanya (am Mittelmeer) bis Cicek (am hinteren Taurus))**




### Kesit 3. Mersin - Bolkar Dağı Kesitinde Ağaç ve Çalı Türlerinin Yayılışı


### (Quersch. 3. Verbreitung der Baum- und Straucharten im Querschnitt von Mersin bis Bolkar-Gebirge)

**Not:** Her yıldızlıde 8 örnek alanda şunlardır.

**Kesit 4. Elmalı havzasında Ayın Gediği - Mancarlı - Elmalı Ovası - Ahatlı - Kara Dağ kesitinde ağaç ve çalı türlerinin yayılışı**  
**(Querscht. 4. Verbreitung der Baum- und Straucharten im Querschnitt vom Elmalı-Becken)**



**Kesit 5. Dedegül Dağı - Bademli - Beyşehir Gölü - Kızılıca Dağ - Hüyük - Kaya Beli - Doğanhisar kesitinde ağaç ve çalı türlerinin yayılışı**  
**(Querscht. 5. Verbreitung der Baum- und Straucharten im West-Ost Querschnitt über Beyşehir-See)**



## ÜBER DIE REGIONALE STANDORTSGLIEDERUNG IM MITTELMER-GEBIET DER TÜRKEI

Doç. Dr. Doğan KANTARCI<sup>1</sup>

### Zusammenfassung

Mittelmeer-Gebiet der Türkei ist ein geographisch differenzierte Teil des Landes und es fast 118 200 Km<sup>2</sup> (15%) der Türkei. Nach den geomorphologisch-klimatischen Eigenschaften durchgeföhrten regionalen Standortsgliederung ist das Mittelmeer-Gebiet zu 4 Wuchsgebietengruppe, 11 Wuchsgebiete und 70 Wuchsbezirke untergliedert. Nach der Landschaftsfähigkeitsklassifikation des Landes sind die 19.2 % des Gebites für Landwirtschaft, 4.8 % unter Bodenschutzmassnahmen für Landwirtschaft und 66.1 % für Forstwirtschaft und Wiedewirtschaft (besonders Almwirtschaft) benutzbar. Wegen der starken Degradationen deckt heutige Waldfläche 49.1 % des Gebietes. Diese Waldfläche sind 4.4 millionen Hektar. Aber nur 7 % der Wälder sind produktiv.

Mittelmeer-Gebiet der Türkei hat eine strategische Lage Einerseits mit hohen Produktionspotential bei Land-, Forst- und Wiedewirtschaft und andererseits mit kurzen billigen Exportwege zu Mittelmeer- und Nahen Ost-Länder. Um die ökologische Grundlage für die Planungen und Investierungen in obengenannten Fachgebieten und neben bei auch Tourismus, Gesundheit-Sport Gebieten vor zu bereiten ist regionale Standortseinheiten im Mittelmeer-Gebiet differenziert.

### 1. EINLEITUNG

Mittelmeer-Gebiet der Türkei liegt zwischen den 35° 51' — 38° 35' nördlichen Länge und 38° 30' — 37° 33' östlichen Breite, und sie deckt 118 200 Km<sup>2</sup> (15 %) des Landes.

Im Mittelmeer-Gebiet sind die regionale Standortseinheiten als Wuchsgebiete, Wuchsbezirke und vertikal-zonale Höhenstufen differenziert (Kantarci, M.D. 1984). Manche Ergebnisse dieser regionaler Gliederung des Mittelmeer-Gebietes sind unten zusammengefasst.

### 2. REGIONALE STANDORTSGLIEDERUNG IM MITTELMEER - GEBIET DER TÜRKEI

Mittelmeer-Gebiet der Türkei ist zu 4 Wuchsgebietengruppe unterscheidet. Dieser vier grossen Standortseinheiten sind zu 11 Wuchsgebietengruppe untergegliedert. Diese Wuchsgebiete sind zu 70 Wuchsbezirke differenziert (Tabelle 1).

Die Differenzierung der regionalen Standortseinheiten ist hauptsächlich nach den geomorphologisch-Klimatischen Beziehungen des Landes durchgeföhrt. Taurus-Gebirge sind fast aus den Kalken und kalkhaltigen Ausgangsgesteinen ausgebildet. Die vulkanische Gesteine kommen verhältnismässig kleinen Flächen vor. Wegen diesem Grund sind die Ausgangsgesteine und dadurch Bodeneigenschaften bei der regionale Standortsgliederung nich berücksichtigen können.

### 3. ÜBER DIE ERGEBNISSE

3.1. Aus der ökologischer Sicht und besonders bei der Standortslehre sind die Zusammenfassung von Ergebnissen unten zitiert. Vor allem sind die methodische Ergebnisse zu bemerken. Die Wuchsgebiete unter dem Meereseffekt sind erst zu den 7 vertikal-zonalen Höhenstufen und dann diese Höhenstufen zu den Wuchsbezirke unterteilt. Wuchsgebiete ausser des Meeressffekt zu den Wuchsbezirke und Teilbezirke gegliedert (Tabelle 1). Diese Anwendungsunterschiede der Standortsgliederung je nach ökologischer Verhältnisse bedeutet nicht eine Vezichtung von Standortsgliederungsprinzipien, sondern es ist eine Umänderung der Gliederungsordnungen.

Im Mittelmeer-Gebiet üben die geomorphologische Verhältnisse starken Effekt über die Klimaeigenschaften und dadurch über Standortseigenschaften. Auf der Südabfall der Taurus-Gebirge herrschen die feucht und milde Klimaverhältnisse unter dem Meereseinfluss. Nach den Expositionen der Hänge von Umgebung Antalya- und İskenderun-Golf sind die herrschende SW-Winde übers Mittelmeer am Front oder an der Seite aufgenommen werden. Wegen diesem Grund sind die Niederschläge im westlichen Mittelmeer-Gebeit mehr als im östlichen (Tabelle 1). Andererseits variieren die Niederschlagsmenge und die Temperaturen von der Küste an bis zur höheren Lagen auf der Südflanke der Taurus-Gebirge. Dadurch sind die vertikal-zonale Höhenstufen gebildet. Diese Standortsunterschiede über über die Verbereitung von natürlichen Baum-und Straucharten gewisse Efekte (Querschnitt 1, 2, 3).

Inneren Wuchsgebiete zwischen der Züge von Taurus-Gebirge sind mehr oder weniger aus der Meereseffekt isoliert. Hier sind die Temperaturen niedriger und Niederschläge weniger und Klima trockener (Tabelle 1). Unter diese kontinental betonte Klimaverhältnisse kommen die Baumwachholderwälder unter dem Şederngürtel in Frostniederschlagsähnlichen Ebene (Querschnitt 4). Die Baum- und Straucharten verbreiten sich auch je nach Expositionen der Hänge und nach vertikal-zonalen Höhenstufen (Q. 4).

In den Wuchsgebieten von Innenseen herrschen auch kontinental betonte Klimaverhältnisse. Die Seen zeigen die feuchte Effekte unter dem herrschenden NO-Wind auf die westlicher Seite. Auf den Hängen der Bergmassiven an der westlicher Seite der Innen-

<sup>1</sup> 1.U. Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Abd. Bahçeköy - İSTANBUL

seen sind die Niederschlagsmenge mehr als östlicher Seite und deutliche Unterschiede kommen bei den Artenzusammensetzung der Wälder (Tabelle 1 und Querschnitt 5).

In den Wuchsgebieten an hinteren Mittelmeer-Gebiet herrschen kontinentale oder Ortweise kontinentalbetonte Klimaverhältnisse. Natürliche Ökosysteme sind unter dem menschlichen Effekt stark degradiert. Die trockene Klimaverhältnisse und intensive Beweidung verhindern die Selbsregeneration der Wälder. Wegen diesem Grund sind die Differenzierung von vertikal-zonalen Höhenstufen in weiten Kahlfächern sehr schwer oder unmöglich. Die regionale Standortseinheiten im hinteren Mittelmeer-Gebiet als Wuchsgebiete und ihre Wuchsbezirke differenziert (Tab. 1 und Q. 2).

**3.2. Aus der bodenkundlicher Sicht** werden die Untersuchungen über die Entstehung und Entwicklung der Böden aus den Kalken und kalkhaltigen Gesteinen im Mittelmeer-Gebiet sehr interessante Ergebnisse herausbringend. Die geomorphologisch-klimatische Verhältnisse in vertikal-zonalen Höhenstufen oder in Wuchsbezirke üben über die Kalk- oder kalkhaltigen Ausgangsgesteine verschiedene Effekte aus und dadurch kommen unterschiedliche Bodenentwicklungen vor. An den unteren Gürteln auf dem Südabfall der Taurus-Gebirge entstehen die typische Terra Rosa aber an den oberen Gürteln (Annähernd über 1700 m) kommen die Böden mit den Auswaschungs- und Durchschlämmungshorizonten vor. In den Wuchsgebieten unter der kontinental betonter Klimaverhältnisse ist die Bodenentwicklung fast ganz anders als Südabfall der Taurus-Gebirge. In solchen Wuchsgebieten sind die Böden wegen der starken Waldvernichtung erodiert. In wenigen Flächen kann man über die Bodenentwicklung dieser Gebiete Auskünfte haben.

**3.3. Nach der Geländefähigkeitsklassifikation im Mittelmeer-Gebiet** sind die 19.2 % Fläche für die Landwirtschaft, die 4.8 % Fläche unter der Bodenschutzmassnahmen für die Landwirtschaft und die 66.1 % Fläche für die Forstwirtschaft und Weidewirtschaft (insbesondere Almwirtschaft) nutzbar. Nach den starken Waldvernichtungen decken heutige Wälder immer noch 49.1 % des Mittelmeer-Gebietes. Heutige Landwirtschaftsfläche sind ihre potentielle Grenze überschreitet und sie decken 29.2 % des Gebietes.

**3.4. Nach der Waldflächeninventar** sind die 4.4 Millionen Hektar Fläche mit den Verschiedenartigen Wäldern oder Waldresten bedeckt. Nur 7 % der Wälder sind mit dem Deckungsgard über 70 % und diese Wälder sind als produktive Wälder angenommen werden. Dagegen 62 % der Waldfläche sind mit den stark degradierten Wäldern und 15 % der Waldfläche sind mit den degradierten Wäldern bedeckt. Insgesamt 77 % der Waldfläche sind unproduktiv. Dazu gehören die Strauchformation von Mittelmeer als Macchie auch. In 16 % der Waldfläche verbreiten die stark durchgeforstete und durchgeplantierte Wälder mit dem Deckungsgrad 40-70 %.

Im Mittelmeer-Gebiet sind die 3.4. Millionen Hektar Waldfläche unproduktiv und diese Fläche sollen in möglichst kurzer Periode aufgeforstet werden. Die Waldbäume wie Hartkiefer (*Pinus brutia*) als schnellwachsender Art, Zeder (*Cedrus libani*) als wertvoller Art und ihre Ökotypen und auch Abies *cilicica*, *Pinus nigra*, *Juniperus foetidissima* u.a. Arten geben eine weite Auswahlmöglichkeit für die Aufforstungen je nach ihrer ökologischen Ansprüche auf den passenden Standorten an.

**3.5. Die Beziehungen zwischen den Verbreitungen von natürlichen Baum- und Straucharten und der geomorphologisch-klimatische Verhältnisse** geben sehr wertvolle Auskünfte für die regionale Differenzierung der Standortseinheiten.

Auf dem Südabfall der Taurus-Gebirge sind die drei Hauptgürtel differenziert. Ab der Küste bis zu 1200 m Höhe verbreiten die Hartkiefernwälder. Zwischen 1200 - 2000 m Höhen verbreiten die Zedernwälder. Über 2000 m Höhe liegt der Weide-Alp-Cürtel. Hartkieferngürtel ist ab der Küste bis zu 100 m Höhe als Küstengürtel, von 100 m bis zu 500 m Höhe als untere Stufe, ab 500 m bis zu 1000 m Höhe als mittlere Stufe, ab 1000 m bis zu 1200 m Höhe als obere Stufe unterscheidet. Zederngürtel ist ab 1200 m bis zu 1500 m als untere Stufe, ab 1500 m bis zu 1750 m Höhe als mittlere Stufe, ab 1750 m bis zu 2000 m Höhe als obere Stufe unterscheidet. Weide-Alp-Gürtel ist ab 2000 m bis zu 2500 m Höhe als Weidegürtel und ab 2500 m Höhe als Alpstufe unterscheidet (Querschnitt 1 und 2). Diese Gürteln und Stufen sind in West- und Ost-Mittelmeer-Gebiet in selben Grenzen unterscheidet. Aber geomorphologisch-klimatische Unterschiede zwischen beiden Wuchsgebieten haben zwischen vertikal-zonalen stufen bestimmte Unterschiede verursacht. Im West-Mittelmeer-Gebiet liegen die Bergmassiyyen gegen dem Süd-Westwind und sie bekommen mehr Niederschlag (bis zu 2200 mm/jahr). Degegen liegen die Bergmassiven im Ost-Mittelmeer-Gebiet (besonders Südflanke von Bolkar-Massiv) nicht gegen dem SW-Wind und hier sind die Niederschlagsmenge weniger (vergl. Tabelle 1.1. und 1.2.). Wegen der verhältnismässig trockeneren Klimaeigenschaften in Ost-Mittelmeer-Gebiet liegt ein Schwarzkiefern - Eichen - Baumwachholder - Gürtel zwischen den Hartkiefern- und Zedern - Gürtel (vergl. Querschnitte 1-2 mit 3). Dagegen kommt die orientalische Buche (*Fagus orientalis*) auf dem feuchten oberen Zedernstufen im Taurus-Amanos-Massiv vor.

In inneren und aus dem Meerseffekt isolierten Wuchsgebiete sind die Frostniedersetzungen in Elmalı - Korkuteli - und Boz Ova - Becken gebildet. In diesen Becken verbreiten die Baumwachholder-Wälder unter dem Zederngürtel. Hartkiefer kommt nur in manchen Südhängen vor, wohin der Meerseffekt verhältnismässig durch die Pässe erreichen kann (Q. 4).

In inneren Seegebiet übt der herrschende NO-Wind einen gewissen Effekt über die Klimaverhältnisse. Die Westseite der Seen sind feuchter, Niederschlags- und Artenreicher als der Ostseite. Denn der NO-Wind treibt die feuchte Luftmassen auf dem Seen über die Hängen der Bergmassiven an der Westseite. Wegen diesen geomorphologisch-klimatischen Gründen kommen unterschiedliche Standortseigenschaften vor und sie wirken über die Artenzusammensetzung der Wälder (Tabelle 1 und Q. 5).

In Wuchsgebiete am hinteren Taurus- und Taurus - Amanos - Massive sind die Wälder durch die starke Degradation fast vernichtet. Die ortweise existierende Waldstücke und Waldreste zeigen die ganz unterschiedliche Standortsverhältnisse als Südabfall der Taurus - Gebirge vor (Q. 2).

**3.6. Klimaverhältnisse im Verbreitungsgebiet von Hartkiefer (*Pinus brutia*)** sind im Sommer feucht und warm, im Winter feucht und mild. Im Verbreitungsgebiet von Hartkiefer sind die durchschnittliche Temperaturwerte im Jahr über 11.5°C, in vier Sommermonaten über 20.5°C, in kältesten Monat 'anuar über 1.5°C (im Allgemeinen zwischen 3.5°C).

**3.7. Klimaverhältnisse im Verbreitungsgebiet von Zeder (*Cedrus libani*)** sind im Sommer feucht (aber lufttrocken) und warm oder in hohen Gürteln mässig warm, im Winter kalt und schneereich. Im Verbreitungsgebiet von Zeder sind die durchschnittliche

Temperaturwerte im Jahr zwischen 6.0 - 12.5°C, in vier Sommermonaten zwischen 12.0-21.0°C, in kältesten Monat Januar zwischen -4.0/+3.5°C. Durchschnittliche Niederschlagswerte sind im Jahr zwischen 650-1400 mm, in vier Sommermonaten zwischen 50-200 mm und im Januar über 75 mm (Kantarci, M.D. 1982 Tabelle 5).

**3.8. In Hartkieferngürtel herrschende Klimaverhältnisse** sind für natürliche Verjüngung der Hartkiefernwälder günstig. Einerseits sind die Temperaturen höher. Andererseits sind die Luftfeuchtigkeitsverhältnisse am Nachmittag durch den See-Winde feucht und gegen Morgen und Vormittag durch den Land-Winde trocken. Diese Luftfeuchtigkeitsänderungen am Tag sind besonders im Frühling, Sommer und Herbst für die Entsamung und Keimung von Hertkiefer bedeutsam.

**Dagegen benötigen die Zedernsamen eine nass-kalte Keimbettperiode.** Die Schneedecke im Zederngürtel gibt diese Keimbettmöglichkeit und sie ermöglicht die Naturverjüngung der Zedernwälder. Diese voneinander stark abweichende ökologische Verhältnisse verursachen die Bildung und Begrenzung der Hartkiefern- und Zederngürtel.

#### 4. SCHLUSSFOLGERUNGEN

Die regionale Standortsgliederung von Mittelmeer-Gebiet der Türkei sollte neben der Forstwirtschaft im Mittelmeer-Gebiet auch andere Fachgebiete dienen.

(1) In erster Linie hat diese regionale Gliederung unsere Kenntnisse über die ökologische Verhältnisse im Mittelmeer-Gebiet erweitert und damit ist die ökologische Grundlage der Forstwirtschaft im Mittelmeer-Gebiet zusammengefasst.

(2) Für die Planungen und für die Investierungen in Fachgebieten wie Forst-, Land- und Weide (Alm)-wirtschaft und auch Tourismus, Gesundheitswesen, Sport u.a. Fachgebieten werden die regionale Standortseinheiten und ihre ökologische Eigenschaften als Grundlage dienen.

(3) Die Agrarpotential ist im Mittelmeer-Gebiet sehr hoch. Durch die Bewässerung, Düngung, Bekämpfung mit der Schädlinge und Pflanzenzüchtung werden die Produktion erhöhen. Türkei hat neben dieser Möglichkeit eine riesige (4.4 Millionen Hektar) Waldgebiete im Mittelmeer-Gebiet und wertvoller Baumarten wie Hartkiefer (*Pinus brutia*) und Zeder (*Cedrus libani*). Neben den hohen Produktionspotential besitzt das Mittelmeer-Gebiet der Türkei mit der Transportmöglichkeiten übers Mittelmeer nach den Mittelmeerbänder und Mittel-Ost-Länder um die Exportierung die Agrar- oder Forst- und Holzprodukte eine strategische Lage und Werte.

Um diese hohe Potential des Mittelmeer-Gebietes der Türkei zu aktivisieren sollte neben anderen Fachgebieten auch die **Forstwirtschaft im Mittelmeer-Gebiet** als **Mittelmeer-Forstwirtschaft** einerseits akademisch durch eine Forstliche Fakultät und andererseits technisch den passenden Methoden auf die ökologische Verhältnisse entwickelt werden.